

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales y bien cerrados.
 - No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
 - Evite su almacenamiento y transporte junto a productos alimenticios o medicinas de uso humano o veterinario.
 - No contaminar los ríos, lagos o fuentes de agua.
 - Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Peligroso para peces, abejas y otras formas de vida silvestre. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DECISIVO 90 PS es un insecticida carbanato sistémico de amplio espectro de acción.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DECISIVO 90 PS se aplica diluido en agua limpia, preparar una pre mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde de agua, luego vaciar el tanque de aplicación y completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN:

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en cualquier etapa del cultivo. Se recomienda un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

DECISIVO 90 PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:

DECISIVO 90 PS No es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil		
Tomate	Gusano del fruto	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4	200	7	1
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.5-0.6	250-300	7	0.1
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	1	2
	Copitarsia	<i>Copitarsia turbata</i>	0.4	200	1	2
Pimiento	Gusano del fruto	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.4	200	3	1
Alcachofa	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4	200	N.D	0.2
	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4	200	N.D	0.2

P.c: Período de Carencia.

N.D.: No Determinado

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (partes por millón).

