

Technical drawing of a horizontal bar with the following dimensions:

- Overall length: $48,0 \pm 0,3$
- Distance from left end to first vertical line: $1,0 \pm 0,3$
- Distance from right end to second vertical line: $1,0 \pm 0,3$

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- ## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- ## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Registro PQUA N° 514 - SENASA

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing. China.

Importado, Envasado y
Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **20 L**

F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

DIFECONASIL® 250 EC es un fungicida sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

DIFECONASIL® 250 EC, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

DIFECONASIL® 250 EC, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de *Stemphylium vesicarium* en esparrago

DIFECONASIL® 250 EC, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

Cuadro de usos:

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200L	L/ha		
AJO	"Roya"	<i>Puccinia allii</i>	200	-	2	0.02
ALCACHOFA	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	100 - 150	-	2	1.0
ARROZ	"Pycnularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2	50	3.0
CEBOLLA	"Punta seca"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200	-	7	0.1
ESPARRAGO	"Mancha foliar"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	200	0.5	7	0.03
GRANADO	"Alternaria"	<i>Alternaria alternata</i>	-	0.6	3	0.1
PAPA	"Alternaria"	<i>Alternaria solani</i>	150	-	14	4.0
VID	"Oidiois"	<i>Erysiphe necator</i>	100	-	7	3.0

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carença

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad

Aplicar **DIFECONASIL® 250 EC** (difenoconazole) máximo 1 aplicación por campaña, considerando dos campañas al año. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto

COMPATIBILIDAD

DIFECONASIL® 250 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando materiales oxidantes, ácidos y bases, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Envase: COEX