

MEDIDAS DEL SOBRE: 36CM X 24 CM
DICIEMBRE DEL 2024

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

FOBOS[®] 50 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:

Iprodione.....500 g/kg

Aditivos.....c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 522 – SENASA

Titular de Registro:

GENAGRO S.A.

Formulado por:

JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO., LTD.

N° 168, Qiuhu Road (S).

Jiangsu 226692, China

Importado y distribuido por:

GENAGRO S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210

Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.

Teléfonos: (511) 4193030

E-mail: info@genagro.com.pe

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. Evite la exposición.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, bien ventilados y bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Lavar los residuos remanentes de la boca y trasladar al intoxicado a un centro de salud.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
GENAGRO S.A: (01) 419-3030

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FOBOS® 50 WP es un fungicida de contacto y con capacidad de ingresar al tejido foliar pero sin presentar un movimiento sistémico. Sobre el hongo impide la germinación de las esporas, inhibe el crecimiento del micelio y la producción de órganos reproductores de esporas.

FOBOS® 50 WP puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar, flores y frutos.
- Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones y rotar con fungicidas con diferente mecanismo de acción (diferentes grupos químicos).

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FOBOS® 50 WP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FOBOS® 50 WP no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta. La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	14	10
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Alcachofa	Podredumbre/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 400	30	1
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500 - 600	7	0.2

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

