

FOBOS[®] 50 WP

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE – WP

Composición Química:

Iprodione.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. ..1 kg

Reg. PQUA N° 522 – SENASA

Titular de Registro:

MONTANA S.A.

Formulado por:



WILLOWOOD LIMITED

17 Floor, Seaview Plaza,
No.283- Shau Kei Wan Road,
Hong Kong.

Importado y Distribuido por: **MONTANA S.A.**

Av. Los Rosales 280,
Santa Anita, Lima, Perú
Teléfono: (511) 4193000
E-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 1 Kg

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA

® Marca registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, iprodione es un POSIBLE CANCERÍGENO.
- Este producto causa irritación moderada a los ojos. Evite la exposición.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, bien ventilados y bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Lavar los residuos remanentes de la boca y trasladar al intoxicado a un centro de salud.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FOBOS® 50 WP es un fungicida de contacto y sistémico, usado para el control de *Botrytis cinerea* en los cultivos de vid y palto.

- Se emplea mezclando con agua la dosis recomendada en el cuadro de usos. Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación.
- Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, atomizadora, etc) que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en épocas críticas del cultivo (floración, cierre de racimo, pinta o pre cosecha), cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de *Botrytis cinerea*.

- Se recomienda una (1) aplicación de **FOBOS® 50 WP** por campaña. En caso que la enfermedad persista, aplicar un fungicida de diferente modo de acción.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FOBOS® 50 WP es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

FOBOS® 50 WP no es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	14	10
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Alcachofa	Podredumbre/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

