

ETIQUETA MEDIDA: 18 X 24 CM  
DICIEMBRE DEL 2024  
AG

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

**FOBOS**<sup>®</sup> **50 WP**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición Química:**

Iprodione ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Reg. PQUA N° 522-SENASA.**

**Titular de Registro:  
GENAGRO S.A.**

**Formulado por:**



**Willowood Limited**  
17 Floor, Seaview Plaza,  
No.283- Shau Kei Wan Road,  
Hong Kong.

**Importado y Distribuido por:  
GENAGRO S.A.**

Av. Javier Prado Este N° 6210  
Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.  
Teléfonos: (511) 4193030  
E-mail: info@genagro.com.pe

**Contenido Neto: 1 kg.**

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**ETIQUETA MEDIDA: 18 X 24 CM**  
**DICIEMBRE DEL 2024**  
**AG**

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto causa irritación moderada a los ojos. Evite la exposición.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos, bien ventilados y bajo llave.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Dicarboximida.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión: Lavar los residuos remanentes de la boca y trasladar al intoxicado a un centro de salud.
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- En caso de contacto con la piel: Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. No existe antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

**SAMU: 106**

**GENAGRO S.A: (01) 419-3030**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**FOBOS® 50 WP** es un fungicida de contacto y con capacidad de ingresar al tejido foliar pero sin presentar un movimiento sistémico. Sobre el hongo impide la germinación de las esporas, inhibe el crecimiento del micelio y la producción de órganos reproductores de esporas. **FOBOS® 50 WP** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Aplicar en forma preventiva o al observar los primeros síntomas, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
- Utilizar un volumen apropiado de agua a fin de lograr una adecuada cobertura sobre el área foliar, flores y frutos.
- Se recomienda dos (02) aplicaciones por campaña con un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones y rotar con fungicidas con diferente mecanismo de acción (diferentes grupos químicos).

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**FOBOS® 50 WP** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, e incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**FOBOS® 50 WP** no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS (g/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Podrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	14	10
Palto	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Alcachofa	Podredumbre/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250 - 300	14	0.02
Mandarina	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 400	30	1
Cebolla	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	500 -600	7	0.2

PC: Periodo de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos

