

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PANTERA 80 WP

FUNGICIDA-ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
 Azufre.....800 g/kg
 Aditivos.....200 g/kg

PQA N° 021 - SENASA
 Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
 Av. Industrial 491, Lima. Perú. Telf: (51-1)336 5428. Fax:(51-1)336-7473

FABRICADO POR: AGROSTULLN GMBH
 Werksweg 2 D-92551, Stulln. Alemania.

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:
 Contenido Neto: 1 Kg.



INFLAMABLE



CORROSIVO



EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA 80 WP es un acaricida formulado en polvo mojable para el control de ácaros (araña roja) contemplado en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar. Aplicar **PANTERA 80 WP** en mezcla con un volumen suficiente de agua uniformemente al follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivos	ENFERMEDAD		Dosis Kg./200 L	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina (*)	Araña roja	<i>Panonychus citri</i>	1.0 (*)	10	50
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	0.75 - 1.0	NR**	NR**
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	0.5 - 1.0	10	50
Palto	Araña roja	<i>Oligonychus peruvianus</i>	0.5 - 0.75	10	50
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.5 - 0.7	NR**	NR**
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	10	NR**

NR: No requiere.
 LMR: Limite máximo de residuos expresados en ppm.
 (*) Volumen total de caldo de aplicación, 2912 Lts. por ha, para el cultivo de Mandarina con una densidad de 416 plantas/ha y con mas de 3 años de producción.
 ** En la UE y USA el azufre se encuentra exento del requerimiento de tolerancias de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación de la plaga para prevenir y controlar la ataque sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones.

PERIODO DE REINGRESO

El periodo de reingreso adecuado es de 24 a 48 horas después de la aplicación del producto. No permita el pastoreo de animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arseniacales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD

PANTERA 80 WP no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice las dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- PANTERA 80 WP es un acaricida ligeramente peligroso para lo cual se debe tener las siguientes precauciones:
- Durante la aplicación, manipuleo o mezcla del producto usar máscara, guantes, ropa apropiada y no comer, beber, ni fumar.
- Evitar inhalar la nube de polvo y contacto con la piel, puede causarle irritación a la nariz, garganta y ojos.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacene ni transporte con productos alimenticios, medicinas, bebidas, semillas, etc.
- Conserve el producto en sus envases originales.
- El producto debe ser transportado en un embalaje adecuado y no conjuntamente con los alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animal; su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- No arroje el sobrante del producto o su mezcla a las fuentes de agua, lagunas, riachuelos, quebradas, acequias, canales de riego, etc.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al medico inmediatamente o lleve al paciente al medico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: ARIS INDUSTRIAL S.A. (01) 336-5428
 CICOTOX 0800-1-30-40

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Manténgase el producto y el desecho de los envases vacíos lejos de los lagos, ríos estanques o arroyos
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Para animales domésticos manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 a 48 horas después de la aplicación.
- Tóxico para abejas.
- No arrojar sobranes del producto o su mezcla a las fuentes de agua.

