1L 28,9x16,5 PEAD 19/05/10

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**
**CICOTOX: 0800-1-3040**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# TRIBUNAL® 500WG

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

**Gránulos dispersables - WG**

**Composición Química:**

Kresoxim methyl..... 500 g/kg
Aditivos ..... 500 g/kg

**Reg. PQUA Nº 255 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**PINERAL ANDINA S.A.**
Av. Flora Tristán 463 Oficina 201
Urbanización Santa Patricia II Etapa.
La Molina. Lima- Perú
Tel: (01) 348-1018 / 349-9609

**Importado y distribuido por:**

**ARIS INDUSTRIAL S.A.**
Av. Industrial 491. Telf. 3365428,
Fax 3367473. Lima Perú

**Formulado por:**

**POINT AGRO-CHINA LIMITED**
Room 1505-1506 Diamond Business Centre
Nanxing Street, Shangcheng District
Hangzhou 310008, China
Tel: +86(0)571-86959101 Fax:+86(0)571-28007617

Contenido Neto: **1Kg**

N° Lote
Fecha de Form.
Fecha de Venc.

**NO EXPLOSIVO** **NO INFLAMABLE**
**NO CORROSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **TRIBUNAL 500WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

- **TRIBUNAL 500WG** se emplea diluído en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

- **TRIBUNAL 500WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | Periodo de carencia (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | gr/cilindro 200 Lt. | Kg/Ha | | |
| PAPRIKA | Oidium | *Leveillula taurica* | 100-150 | 0.25-0.35 | 7 | 1 |
| VID | Oidium | *Erysiphe necator* | 100 | 0.3 | 7 | 0.5 |
| CEBOLLA | Stemphylium | *Stemphylium vesicarium* | 120 | 0.35* | 7 | 0.05 |

LMR: Límite Máximo de Residuos * Gasto de agua : 520 L/Ha

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

**TRIBUNAL 500 WG** se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**
Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**
TRIBUNAL 500 WG es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**
No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**