# TRIBUNAL®
# 500WG

## PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN:**

Kresoxim methyl .....500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

**Reg. PQUA Nº 255 - SENASA**

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**
**POINT ANDINA S.A.**
Calle Loreto 304 Urbanización Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

**Formulado por:**
**POINT AGRO-CHINA LTD**
Wan Shi Town,
Yixing, Jiangsu; 214217 China
Tel (86-510) 8785 1001

**Contenido neto: 1 kg**
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

## LIGERAMENTE PELIGROSO
## CUIDADO

## "LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
## "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:**
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TRIBUNAL 500WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

**TRIBUNAL 500WG** se emplea diluído en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**TRIBUNAL 500WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**TRIBUNAL 500 WG** se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**

TRIBUNAL 500 WG es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | g/cilindro 200 L | kg/ha | | |
| Alcachofa | "Oidium" | *Leveillula taurica* | - | 0.3 | N.A | 0.05 |
| Cebolla | "Stemphylium" | *Stemphylium vesicarium* | 120 | 0.35* | 7 | 0.05 |
| Espárrago | "Stemphylium | *Stemphylium vesicarium* | 80 | 0.20 | 7 | 0.05 |
| Mango | "Oidium" | *Oidium mangiferae* | - | 0.2 | 48 | 0.05 |
| Palto | "Botritis" | *Botrytis cinerea* | - | 0.3** | N.A | 0.05 |
| Páprika | "Oidium" | *Leveillula taurica* | 100-150 | 0.25-0.35 | 7 | 1 |
| Vid | "Oidium" | *Erysiphe necator* | 100 | 0.3 | 7 | 0.5 |

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón) * Gasto de agua : 520 L/ha **Gasto de agua: 750L/ha
PC: Periodo de Carencia. N.A.: No Aplica.