

9.9 cm

26.5 cm

TRIBUNAL®
500WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Kresoxim methyl..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA Nº 255-AG-SENASA

Grupo Químico :

Estrobilurinas

Nombre Químico :

methyl (E) - 2-(methoxymino) - {2-(o-toloxymethyl)phenyl} acetato


Formula Empírica:

C₁₈ H₁₈ N O₄

Peso Molecular :

313.36 g/mol

Formula Estructural:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Gránulos
Color: Marrón
Olor: Ligero olor a azufre
pH: 10.6
Densidad: 0.54 g/ml a 20°C
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

20g, 40g, 60g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg.

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:

POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto 304 Urbanización

Santa Patricia

II Etapa. La Molina. Lima Perú

Teléfono: 3481018 - 3499609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LTD

Wan Shi Town,

Yixing, Jiangsu; 214217 China

Tel (86-510) 8785 1001



Point
ENTREGAMOS
CALIDAD

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

• Peligroso para organismos acuáticos.

• No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

• Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

• El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

• Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

• En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

• Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
•

PRIMEROS AUXILIOS:

• Grupo químico: Estrobilurinas.
• En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
• No se ha determinado antídoto específico.
• Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

• Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.

• Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.

• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

• Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRIBUNAL 500WG es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

TRIBUNAL 500WG se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

TRIBUNAL 500WG puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

TRIBUNAL 500 WG se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

TRIBUNAL 500 WG es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCEIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	g/cilindro 200 L	kg/ha		
Alcachofa	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.3	N.A.	0.05
Cebolla	“Stemphylium”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	120	0.35*	7	0.05
Espárrago	“Stemphylium”	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	0.20	7	0.05
Mango	“Oidium”	<i>Oidium mangiferae</i>	-	0.2	48	0.05
Palto	“Botritis”	<i>Botrytis cinerea</i>	-	0.3**	N.A.	0.05
Páprika	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	100-150	0.25-0.35	7	1
Vid	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	100	0.3	7	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón) * Gasto de agua : 520 L/ha
PC: Período de Carencia.

**Gasto de agua: 750L/ha
N.A.: No Aplica



PANTONES



376 C



362 C



341 C



7740 C



293 C



C:91 M:37 Y:98 K:5

LOGO POINT

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO TRIBUNAL 500 WG