26.5 cm

# TRIBUNAL® 500WG

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRÁNULOS DISPERSABLES - WG**

**COMPOSICIÓN:**
Kresoxim methyl..... 500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

**Reg. PQUA Nº 255-AG-SENASA**

**Grupo Químico :**
Estrobilurinas
**Nombre Químico :**
methyl (*E*) - 2-(methoxymino) – {2-(o-toloxymethyl)phenyl} acetato
**Formula Empírica:**
$C_{18}H_{19}NO_4$
**Peso Molecular :**
313.36 g/mol
**Formula Estructural:**



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**
Estado físico: Gránulos
Color: Marrón
Olor: Ligero olor a azufre
pH: 10.6
Densidad: 0.54 g/ml a 20ºC
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

**PRESENTACIONES COMERCIALES:**
20g, 40g, 60g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 10kg.

**Titular de Registro, Importado y Distribuido por:**
**POINT ANDINA S.A.**
Calle Loreto 304 Urbanización
Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: 3481018 - 3499609

**Formulado por:**
**POINT INTERNATIONAL LTD.**
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862

Point
ENTREGAMOS CALIDAD

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
-

**PRIMEROS AUXILIOS:**
- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

**Teléfonos de emergencia :**
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 opción 4
CISPROQUIM: 0800 50847

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**



**LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**TRIBUNAL 500WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

**TRIBUNAL 500WG** se emplea diluído en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

**TRIBUNAL 500WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN**
Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**TRIBUNAL 500 WG** se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**
Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

**COMPATIBILIDAD**
**TRIBUNAL 500 WG** es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**
No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

**EFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS**
No tiene efecto sobre otros cultivos.

**EFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES**
No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | g/cilindro 200 L | kg/ha | | |
| Alcachofa | "Oidium" | *Leveillula taurica* | - | 0.3 | N.A. | 0.05 |
| Cebolla | "Stemphylium" | *Stemphylium vesicarium* | 120 | 0.35* | 7 | 0.05 |
| Espárrago | "Stemphylium | *Stemphylium vesicarium* | 80 | 0.20 | 7 | 0.05 |
| Mango | "Oidium" | *Oidium mangiferae* | - | 0.2 | 48 | 0.05 |
| Palto | "Botritis" | *Botrytis cinerea* | - | 0.3** | N.A. | 0.05 |
| Páprika | "Oidium" | *Leveillula taurica* | 100-150 | 0.25-0.35 | 7 | 1 |
| Vid | "Oidium" | *Erysiphe necator* | 100 | 0.3 | 7 | 0.5 |

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón) * Gasto de agua : 520 L/ha **Gasto de agua: 750L/ha
PC: Periodo de Carencia. N.A.: No Aplica

9.9 cm

PANTONES

376 C 362 C 341 C 7740 C

293 C

C:91 M:37 Y:98 K:5

LOGO POINT

BANDA TOXICOLÓGICA

LOGO TRIBUNAL 500 WG