PRECAUCIONES

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al area tratada en las primeras 12 horas.
Conserve en lugar seco y en su envase original.
No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
No reuse el envase, destrúyalo.
No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con la piel, lavar la zona afectado con abundante agua y jabón.

NOTAS AL MEDICO

Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

DL 50 Oral Aguda: > 2.000 mg/kg
DL 50 Dermal Aguda: > 4.000 mg/kg

¡NO EXPLOSIVO! **¡NO CORROSIVO!** **¡INFLAMABLE!**

RIVAL®

(Acido Giberelico)

Regulador de crecimiento de plantas

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Acido Giberelico..... 40.0 g/l
Alcohol isopropilico ..... 758.0 g/l

Registro PBUA N°0228-SENASA

Titular de Registro y Formulador:

Comercial Andina Industrial S.A.C.
Calle El Galeón Nº 180 Surco - Lima - Perú

Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.
Calle El Galeón Nº 180 Surco - Lima - Perú
Telf.: 271-3366 Fax: 271-1988

CONTENIDO NETO: 1 Litro
Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Fecha de vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RIVAL es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RIVAL se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación. RIVAL puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	Dosis x 200 L agua	Momento de uso	LMR PPM	P.C.
Cebolla	25 - 50 cc	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	5	15

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN