LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve en lugar seco y en su envase original.
- No lo transporte, ni almacene con alimentos y/o animales.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- Mantenga el envase bien cerrado y etiquetado.
- No reuse el envase, destrúyalo.
- No contamine los arroyos con el lavado de equipos de aspersión o con la eliminación de residuos.

PRIMEROS AUXILIOS
- Al contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

NOTA AL MÉDICO
- Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.
  DL 50 Oral Aguda: > 2.000 mg/kg
  DL 50 Dermal Aguda: > 4.000 mg/kg

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO EXPLOSIVO **NO CORROSIVO** **INFLAMABLE**

RIVAL®

(Acido Giberelico)

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Acido Giberelico..... 40 g/L
Alcohol isopropilico.....758 g/L

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Reg. PBUA Nº 0228 - SENASA

Titular de Registro y Formulador:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av Benavides 1579, Ofinica 702, Edificio Del Park II, Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 253 - 6444 Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1L

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

INDICATIVOS DE USO
RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Dosis x 200 L agua	Momento de uso		
CEBOLLA	25 - 50 cc	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	15	5
PAPA	25 cc	Brotamiento del tubérculo	N.D.	5

LMR: Límite Máximo de Residuos ND: No determinado PC: Periodo de carencia

COMPATIBILIDAD:RIVAL® es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:RIVAL® no es fitotóxico usado a la s dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendados en la presente etiqueta.

"MANTENGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"