14.5 x 29.2 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aguas para consumo

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- Si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón por 15 minutos.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
SAMU: 106
CAISAC: 01-253-6444
CICOTOX (01) 328-7700

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacía cuerpos de agua de al menos 5 m.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

RIVAL®

(Acido Giberelico)

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN:
Acido Giberelico..... 40 g/L
Alcohol isopropilico..... 758 g/L

Reg. RCP N° 228 – SENASA

Titular de Registro, Formulador y Distribuidor:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18-Perú.
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
RIVAL® es un regulador de crecimiento de plantas que favorece el rendimiento del cultivo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN
RIVAL® se emplea diluido en agua; preparar una pre mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.
RIVAL® puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Momento de aplicación	Dosis ml/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
ALCACHOFA	La aplicación deberá realizarse durante el desarrollo vegetativo (60,75 y 90 días).	125	7	5
ALFALFA	Crecimiento vegetativo.	50	N.A.	5
CEBOLLA	La aplicación deberá ser foliar cuando el cultivo tenga 40 días después de realizado el transplante.	25 - 50	15	5
PAPA	Brotamiento del tubérculo.	25	N.A.	5
VID	La aplicación debiera realizarse en: 1° Bayas de 9-12 mm de diámetro. 2° Bayas de 14-16 mm de diámetro. 3° Bayas de 18-20 mm de diámetro.	150	14	5

P.C: Periodo de carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda un máximo de tres aplicaciones por campaña con frecuencia de 15 días entre aplicaciones. Considerar 1 campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO
No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
RIVAL® es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD
RIVAL® no es fitotoxico a la dosis y usos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las caracteristicas físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e intrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA

PRECAUCIÓN

1.3 cm

Logo caisac Pantone 711 C
Logo caisac Pantone 2945 C
Banda verde Pantone 347C