

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es ligeramente peligroso, no ingerir. CUIDADO, evite el contacto, probable carcinógeno. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora. Utilice ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto. Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión. Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla. El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.

PRIMEROS AUXILIOS

Kresoxim methyl: Grupo Químico: Estrobilurinas.

Epoxiconazole: Grupo Químico: Triazole.

En caso de ingestión: Solicitar atención médica inmediata o lleve al paciente al centro médico llevando la etiqueta.

En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Consultar con el médico.

En caso de ingestión accidental: Llamar al médico. Beber agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

Nota para el médico: Tratamiento sintomático. No tiene antídoto

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX : 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A. : 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Evite la contaminación de fuentes de agua, no verter producto en ellas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. Evitar que el producto se aplique sobre suelos con napa freática superficiales o en suelo altamente permeable. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MODERADAMENTE TOXICO A PECES. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto.

Juwel®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada SC

COMPOSICIÓN :

Kresoxim-methyl 125.00 g/L

Epoxiconazole 125.00 g/L

Reg. PQUA N° 474-SENASA



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO,

IMPORTADO Y

DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O. R. Benavides 5915 - Callao

Casilla 3911, Lima 100

Tel.: (01) 513 2500

Fax: (01) 513 2517

(01) 513 2519

FORMULADO POR:

BASF Española S.L.

Carretera N-340, km 1156 43006

Tarragona

España

Tel.: +34 977 25-6200

Contenido neto: 500ml

N° de Lote:

Fecha Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO

® = Marca Registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES

Juwel® es un fungicida de acción curativa y preventiva, compuesto de dos ingredientes activos: Epoxiconazole y Kresoxim methyl, combina dos modos de acción diferentes y complementarios: Sistémico y Mesosistémico. Por ser Juwel® una suspensión concentrada, se recomienda agitar el envase antes de usar el producto.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la enfermedad y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico			
Arroz	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.8	35	0.05 ⁽¹⁾ 0.10 ⁽²⁾

(1) Kresoxim-methyl

(2) Epoxiconazole

* PC = Período de Carencia

** LMR = Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Aplicar Juwel® cuando aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, a la aparición del primordio de espiga y una segunda aplicación a los 10 - 14 días después del 80 - 90% de emergencia de la inflorescencia.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se debe evitar aplicar Juwel® con productos de reacción alcalina, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD: Bajo las condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

