

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO TRANSPORTE

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- No causa irritación dermal ni ocular.
- No es un sensibilizante.
- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó
CISPROQUIM: 080-050-847

NOTA AL MEDICO

DL₅₀ oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)
DL₅₀ dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El fabricante garantiza que las características físico-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante concepto de eficacia se verifico que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso.

POLYMAX WP es un potente fungicida biológico cuyo ingrediente principal es la polioxina B. Ésta causa la inhibición de la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando su desarrollo.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Disolver la dosis recomendada en 100 litros de agua, luego completar a 200 L.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

Cultivo	Enfermedad		Dosis (kg/200 L)	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	Exento	Exento
Pimiento páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	Exento	Exento
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	Exento	Exento
Holantao	Oidium	<i>Erysiphe pisi</i>	0.3 - 0.4	Exento	Exento

PC: Ultima aplicación antes de cosecha (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

EXENTO: Según EPA

COMPATIBILIDAD

POLYMAX WP es compatible con productos de uso común.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES**



**DESTRUYA ESTE ENVASE DESPUÉS DE USAR
EL PRODUCTO**

