

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “ESTE PRODUCTO DITOCARBAMATO NO PUEDE SER USADO POR PERSONAS QUE MANTENGAN TRATAMIENTO PARA EPILEPSIA, ESPECIALMENTE CON FENOBARBITAL. MANTENER ALEJADAS DEL ÁREA DE APLICACIÓN A PERSONAS EMBARAZADAS”.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - Causa irritación moderada a los ojos, evite el contacto directo y prolongado.
 - Irritante a la piel, si el contacto fuese con la piel retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, incluido el cabello.
 - Sensibilizante al contacto con la piel, evitar el contacto directo y prolongado con la piel.
 - No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Mientras llega el médico retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar fresco y ventilado.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**
CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf.: 423-7600
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto”.
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre”.
- “No aplicar en áreas con napa fréatica superficiales”.
- “En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.

DK-ZEB 40 LIQ

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
 Mancozeb 400 g/L
- Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 076 - SENASA

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Número de Lote :
 Fecha de Formulación :
 Fecha de Vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
 Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.
 Telf.: 219-3901 / Fax: 219-3929

FABRICANTE:
 HEBEI SHUANGJI CHEMICALS COMPANY, LTD
 East suburb of Xinji City Hebei Province P. R. China

FORMULADO POR: LAQUINSA ANDINA S.A.
 Kilometro 5.5 Vía Duran - Tambo. Ecuador.

ENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**
 Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-ZEB 40 LIQ es un fungicida a base de Mancozeb usado para prevenir el ataque del Hielo o Mancha en el cultivo de papa, y Cercospora en el cultivo de Espárrago. Actúa por contacto inhibiendo los grupos sulfhídricos (SH) de los aminoácidos, proteínas y enzimas de las células de los patógenos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-ZEB 40 LIQ se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. Aplique con equipo de aspersión manual o a motor.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/200 L	DOSIS L/ha	LMR ppm	PC días
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO				
Papa	Hielo o Mancha	<i>Phytophthora infestans</i>	1.2 - 1.5	2.4 - 3	0.1	21
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.66 - 1	2 - 3	0.1	28

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar un máximo de 2 aplicaciones / campaña / año, en períodos de 7 - 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas y del estado fenológico del cultivo.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

DK-ZEB 40 LIQ, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

