

MEDIDAS:36cm x 26cm  
DICIEMBRE 2024  
AG

TIRA

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

VITENE®

80 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Mancozeb ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 541 - SENASA

Titular de Registro:  
GENAGRO S.A.

Fabricado y formulado por:



Willowood Limited.  
17/F, Seaview Plaza, N° 283  
Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan.  
Hong Kong.

Importado y distribuido por:

GENAGRO S.A.  
Av. Javier Prado Este N° 6210,  
Ofi. 401, La Molina, Lima - Perú  
Teléfono: (511) 419 3030  
E-mail: info@genagro.com

Contenido Neto: 1 kg

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de venc.:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

MEDIDAS:36cm x 26cm  
DICIEMBRE 2024  
AG

# RETIRA

## LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en un lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

MONTANA: (01) 419-3000

### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- VITENE 80 WP** es un fungicida de contacto (no sistémico) de amplio espectro de acción. Es recomendado para el control de *Alternaria*, *Pseudoperonospora*, *Helminthosporium*, *Botrytis*, *Septoria*, *Puccinia*, *Alternaria*, *Phytophthora*, *Cercospora*, *Mycosphaerella* y *Plasmopara*, entre otros, en diversos cultivos hortícolas y frutales.
- VITENE 80 WP** actúa de forma preventiva inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento del tubo germinativo. Afecta diferentes procesos vitales ya que inactiva al grupo sulhidrido en aminoácidos y enzimas de la célula fungosa, de esta manera interrumpe la actividad enzimática, además afecta la disrupción del metabolismo de lípidos afectando la permeabilidad de la membrana o la disrupción de la respiración y la producción de ATP en la célula del hongo.
- VITENE 80 WP** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o envase, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar cuando las condiciones ambientales sean las propicias para el desarrollo de la enfermedad.
- En papa iniciar las aplicaciones preventivamente. Antes que el patógeno se establezca.
- En mandarino se recomienda la aplicación de **VITENE 80 WP** en forma preventiva cuando el 50% de las inflorescencias muestren el estado de botón blanco, realizando aplicaciones con un intervalo de 10 a 15 días entre aplicaciones.

### PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

### COMPATIBILIDAD

**VITENE 80 WP** es compatible con aquellos productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar una mezcla con fertilizantes foliares que contengan macroelementos o microelementos quelatados es recomendable hacer una prueba previa de compatibilidad con el producto.

### FITOTOXICIDAD

**VITENE 80 WP** no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | ENFERMEDAD       |                               | DOSIS<br>(g/200 L) | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
|           | Nombre Común     | Nombre Científico             |                    |              |              |
| Papa      | Rancha           | <i>Phytophthora infestans</i> | 500                | 14           | 0.3          |
| Espárrago | Mancha del peral | <i>Stemphylium vesicarium</i> | 700                | 28           | 0.1          |
| Mandarino | Podredumbre gris | <i>Botrytis cinerea</i>       | 600-750            | 15           | 10           |

PC: Periodo de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

