

27 cm

15 cm

2.25 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PROCURE® es moderadamente irritante a la piel; evite contacto con piel y ropa.
PROCURE® es moderadamente irritante a los ojos; evite salpicaduras.
Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o la aspersión.
PROCURE® es ligeramente peligroso por ingestión.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación, mezcla y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, careta de protección, gafas y ropa protectora.
Utilices ropa protectora para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. Durante la aplicación evite el contacto directo con el producto.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
No utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos o bebidas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Triazoles
En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, de respiración artificial si es necesario.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15-20 minutos. Consultar al médico.
En caso de ingestión accidental: Llamar al médico inmediatamente. Dar a beber agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor.
No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
Nota al médico: Tratar de acuerdo a los síntomas (descontaminar, funciones vitales), no se conoce antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEY CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"Peligroso para organismos acuáticos"
No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe de aplicarse en zonas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

Procure®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Penconazole 200 g/L
Dimethyl-Formamide 150 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 543 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,

Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:

JIANGSU SEVENCONTINENT
GREEN CHEMICAL CO. LTD.
28 Chegbel Road,
Zhangllagang
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 1L
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROCURE® es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa, es absorbido a través de las hojas por acción acropétala.

PROCURE® actúa mediante la inhibición de la metilación, compuesto que inhibe el paso del C-14 dimetilación mediante la biosíntesis del esteroles fungal, llevando a cambios morfológicos y funcionales de la membrana celular del hongo.

PROCURE® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación, previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

PROCURE® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/Ha)	(ml/cil de 200L)		
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	75	14	0.2

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar el producto cuando se noten los primeros síntomas de la enfermedad en el campo. Realizar una aplicación de **PROCURE®** por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada. HASTA QUE LA ASPERSIÓN HAYA SECADO.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas de campo.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envases corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

