18 cm

8 cm

Procure®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Penconazole	..... 200 g/L
Dimethyl-Formamide	.....150 g/L
Aditivos	..... csp 1L

PQUA N° 543 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
SINOCHEM NINGBO LTD.
21 Jiangxia St,
Ningbo 315 000.
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **250 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

1.2 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/Ha)	(ml/cil de 200L)		
Pimiento (*Capsicum annuum*)	"Oidium"	*Leveillula taurica*	0.15	75	14	0.2
Sandia (*Citrullus lanatus*)	"Oidiosis"	*Erysiphe cichoracearum*	—	50 - 75	3	0.1
Zapallo (*Cucurbita maxima*)	"Oidiosis"	*Erysiphe cichoracearum*	—	50 - 75	3	0.1
Frijol (*Phaseolus vulgaris*)	"Oidiosis"	*Erysiphe betae*	—	50 - 75	7	0.05

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos