

8 cm

12 cm

18 cm

Procure®

FUNGICIDA AGRÍCOLA**EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)****COMPOSICIÓN:**

Penconazole 200 g/L
Dimethyl-Formamide 150 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 543 - SENASA**INTEROC @ CUSTER**

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU SEVENCENTINENT
GREEN CHEMICAL CO., LTD**
28 Chegbei Road,
Zhanglagang, China.

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **250 ml**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)****Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100****“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(L/Ha)	(ml/cil de 200L)		
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	75	14	0.2
Sandia (<i>Citrullus lanatus</i>)	“Oidiosis”	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	—	50 - 75	3	0.1
Zapallo (<i>Cucurbita maxima</i>)	“Oidiosis”	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	—	50 - 75	3	0.1
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	“Oidiosis”	<i>Erysiphe betae</i>	—	50 - 75	7	0.05
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	“Oidium”	<i>Leveillula taurica</i>	—	75	14	0.2

PC: Periodo de Carenacia

LMR: Límite Máximo de Residuos

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**