EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Penconazole . 200 g/L Dimethyl-Formamide ..150 g/L csp 1L Aditivos

PQUA N° 543 - SENASA

Formulador: JIANGSU SEVENCONTINENT GREEN CHEMICAL CO., LTD 28 Chegbel Road, Zhanglagang, China.

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,

Titular de Registro, Importador y Distribuidor: INTEROC S.A. Av. Santa Cruz 875 Oficina 300 - Miraflores Telf: (511) 614-5100 Lima - Perú

Fecha de Formulación N° de Lote Contenido Neto Fecha de Vencimiento 250 ml

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	ml/cil de 200L	(días)	(ppm)
Pimiento (Capsicum annuum)	"Oidium"	Leveillula taurica	0.15	75	14	0.2
Sandía (Citrullus lanatus)	"Oidiosis"	Erysiphe cichoracearum	_	50 - 75	3	0.1
Zapallo (Cucurbita maxima)	"Oidiosis"	Erysiphe cichoracearum	_	50 - 75	3	0.1
Frijol (Phaseolus vulgaris)	"Oidiosis"	Erysiphe betae	_	50 - 75	7	0.05
Alcachofa (Cynara scolymus)	"Oidium"	Leveillula taurica	_	75	14	0.2
Mango (Mangifera indica)	"Oidiosis"	Oidium mangiferae	_	50 - 75	21	0.1

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO











1.2 cm

S

 ∞