

18 cm

Procure®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN:

Penconazole 200 g/L
 Dimethyl-Formamide 150 g/L
 Aditivos csp 1L

PQA N° 543 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

Titular de Registro,
 Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
 Av. Santa Cruz 875
 Oficina 300 - Miraflores
 Telf.: (511) 614-5100
 Lima - Perú

Formulador:
**JIANGSU SEVENCENTINENT
 GREEN CHEMICAL CO., LTD**
 28 Chegbel Road,
 Zhanglagang, China.

Fecha de Formulación :
 N° de Lote :
 Contenido Neto : **250 ml**
 Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
 En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

**TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICAS
 CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
 Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/Ha	ml/cil de 200L		
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.15	75	14	0.2
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	—	50 - 75	3	0.1
Zapallo (<i>Cucurbita maxima</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	—	50 - 75	3	0.1
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	—	50 - 75	7	0.05
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	—	75	14	0.2
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	"Oidiosis"	<i>Oidium mangiferae</i>	—	50 - 75	21	0.1
Arveja (<i>Pisum sativum</i>)	"Oidiosis"	<i>Erysiphe betae</i>	—	75	14	0.05

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

8 cm

1.2 cm

**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

