

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurinas.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos; si la irritación es grave, buscar asistencia médica. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe implementar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

TRIBUNAL®

500WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos dispersables - WG

Composición Química:

Kresoxim methyl..... 500 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1kg

Reg. PQUA N° 255 - SENASA

Titular de Registro:

PINERAL ANDINA S.A.
 Av. Flora Tristán 463 Oficina 201
 Urbanización Santa Patricia II Etapa.
 La Molina. Lima- Perú
 Tel: (01) 348-1018 / 349-9609

Formulado por:

POINT AGRO-CHINA LIMITED
 Room 1505-1506 Diamond Business Centre
 Nanxing Street, Shangcheng District
 Hangzhou 310008, China
 Tel: +86(0)571-86959101 Fax: +86(0)571-28007617

Importado y distribuido por:

ARIS INDUSTRIAL S.A.
 Av. Industrial 491. Telf. 3365428,
 Fax 3367473. Lima Perú



Contenido Neto: 200 gr

N° Lote
 Fecha de Form.
 Fecha de Venc.

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **TRIBUNAL 500WG** es un fungicida de acción preventiva y curativa que actúa inhibiendo la respiración de los mitocondrios, por lo tanto bloquea la formación del ATP necesario que requiere el hongo para su metabolismo y como consecuencia causa la muerte del patógeno.

• **TRIBUNAL 500WG** se emplea diluido en agua limpia. Preparar una pre-mezcla adicionando la dosis recomendada del producto en un balde con agua; luego vaciar al tanque de aplicación, completar el volumen de agua a utilizar y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

• **TRIBUNAL 500WG** puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (nebulizadoras, pulverizadoras de mochila, estacionarias o montadas a tractor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	gr/cilindro 200 Lt.	Kg/Ha		
PAPRIKA	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	100-150	0.25-0.35	7	1
VID	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	100	0.3	7	0.5
CEBOLLA	Stemphylium	<i>Stemphylium vesicarium</i>	120	0.35*	7	0.05
ESPARRAGO	Stemphylium	<i>Stemphylium vesicarium</i>	80	0.20	7	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos * Gasto de agua : 520 L/Ha

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

TRIBUNAL 500 WG se aplicará cuando se observen síntomas iniciales de la enfermedad, o cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del hongo. Realizar una aplicación por campaña/año. En caso sea necesario, efectuar una segunda aplicación como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

TRIBUNAL 500 WG es compatible con la mayoría de pesticidas agrícolas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos cuando es usado según se recomienda.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

