

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES: Manipuleo - Almacenaje - Transporte

Aunque el ingrediente activo de ETHREL 4 es de baja toxicidad, deben observarse las siguientes precauciones básicas en su manejo, transporte, almacenamiento y aplicación:

Lea la etiqueta detenidamente antes de usar el producto.

Usar anteojos protectores durante el manejo y aplicación.

Evite el contacto con la piel y la ropa y no inhale la niebla porque este producto irrita la piel y las mucosas.

No contaminar las fuentes de agua potable ni de riego.

Evite el arrastre de la niebla hacia cultivos vecinos, pues puede causar daños a las plantas y reducir la producción.

No siembre otros cultivos en las áreas tratadas dentro de los 30 días posteriores a una aplicación.

Uselo sólo en los cultivos y dosis recomendados en esta etiqueta.

No beba, no coma, ni fume durante su aplicación.

Prepare y use siempre soluciones frescas diariamente.

No almacene soluciones de un día para otro.

Evítese la contaminación de alimentos y medicinas de uso humano y animal.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión, provocar vómitos con agua tibia y guardar reposo. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa (lavarla antes de volverla a usar) y lavarse las partes afectadas con abundante agua limpia y jabón.

En caso de inhalación, deje de aplicar, retírese del área de aplicación y obtenga atención médica. Normalmente no se requiere asistencia médica, pero en caso de molestias o irritación de la piel debe recurrirse a un médico.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua limpia y obtener asistencia médica.

ANTIDOTO:

No existe antídoto específico.

NOTA AL MEDICO:

El tratamiento es sintomático.

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACION

CICOTOX: 0800-1-30-40 CISPQUIIM: 0800-50847

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

Ethrel 4

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE USO AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Etephon, 480 g/L
Ingredientes inertes, 520 g/L

Reg. N° 070-96-AG-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro

Formulado por:
Bayer CropScience
Cra. 7ª Nr 71-21
Torre A - Piso 9
Tel: 3138480
Bogotá - Colombia

Distribuido por:
Farmagro S.A.
Panamericana Norte 6068 Km. 19.5
Lima - Perú, Telf.: 528-1133

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

¡NO EXPLOSIVO!
® = Marca Registrada

 **Bayer CropScience**


Importado por:
Bayer CropScience S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro
Lima - Perú
Telf.: 2113800



¡CORROSIVO!



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO: ETHREL 4 es un compuesto a base del ácido (2-cloroetil) fosfónico, que al ser aplicado a las plantas libera etileno, que es una hormona vegetal natural que interviene en los procesos de maduración, floración y coloración de frutos cosechados de cultivos como: plátano, manzanos, naranjo, mango, higos, etc. ETHREL 4 puede ser aplicado al follaje (pre-cosecha) y/o en baños directos a los frutos cosechados.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

USO ESPECIFICO

CULTIVO	USO	DOSIS	INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO	L.M.R. (ppm)
Naranja	Acelerar la coloración de los frutos después de cosechados.	400 ml/100 litros de agua	Aplicar la solución de ETHREL 4 sobre los frutos cosechados sea por aspersión o inmersión. Se recomienda lavar los frutos previamente con una solución que contenga un fungicida, dejarlos escurrir u crear y aplicar luego la solución de ETHREL 4.	2
Mango	Acelerar maduración de los frutos después de cosechados.	400 ml/100 litros de agua	Frutos cosechados verdes pero totalmente desarrollados se sumergen en la solución de ETHREL 4. Se recomienda aplicar previamente a los frutos un fungicida, para evitar pudriciones.	-
Plátano	Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos después de cosechados	400 ml/100 litros de agua	Sumergir o rociar los frutos cosechados, usando la solución de ETHREL 4. Se recomienda añadir un fungicida para evitar pudriciones.	-
Manzano	Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos.	75 ml/100 litros de agua	Aplicar 2 a 3 semanas antes de la cosecha dirigiendo la aspersión a los frutos.	5
Higo	Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos.	100 ml/100 litros de agua	Aplicar cuando el 70% -90% de los higos de la parte basal inicien su maduración.	5
Vid	Acelerar y uniformizar la maduración de los frutos.	0,075 a 0.1 l / 200 litros	Aplicar la solución de ETHREL 4 por aspersión en campo sobre los racimos. Aplicar con buena cobertura al inicio de la pinta	0.7

NOTA AL COMPRADOR: “NO APLICAR EN CULTIVOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS CON DESTINO A EUROPA.”

LIMITACIONES Y OTRAS INSTRUCCIONES GENERALES IMPORTANTES

- Temperaturas medias inferiores a 16°C pueden anular los efectos de ETHREL 4, mientras que temperaturas medias superiores a 35°C normalmente aceleran y acentúan los efectos, pudiendo causar amarillamiento del follaje, defoliación y/o caída de frutos pequeños excesivos, particularmente en cultivos o variedades susceptibles.

- ETHREL 4 no induce la maduración de frutos o plantas que no estén FISIOLÓGICAMENTE MADUROS (ejem.: plintones o en sazón), aunque puede provocar la coloración y/o caída de frutos pequeños e inmaduros. Consecuentemente, NO DEBE aplicarse prematuramente pues puede reducirse la cantidad y/o calidad de la producción.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

INCOMPATIBILIDAD:

No utilizar en mezcla con fungicidas metálicos, pues estos precipitan e inactivan al ETHREL 4.

- ETHREL 4 actúa por contacto y no se transloca, por lo tanto, es sumamente importante cubrir bien los frutos, las hojas y ramas según los efectos que se persigan en cada caso. Por consiguiente, se recomienda poner especial cuidado en la selección del equipo y el método de aplicación y usar siempre un volumen de agua suficiente para asegurar una total y uniforme cobertura. En general, salvo para maduración de caña de azúcar, SE RECOMIENDA UTILIZAR EQUIPOS MANUALES O TERRESTRES DE ALTO VOLUMEN Y MOJAR LAS PLANTAS HASTA EL PUNTO DE ESCURRIMIENTO.

- En general se recomienda usar las dosis altas en condiciones desfavorables para la acción del producto (ejem. temperaturas medias de 18°C hasta 20°C, exceso de fertilidad en tabaco, etc.) y/o en cultivos densos o frondosos y las dosis bajas en condiciones favorables para la acción del producto (ejem. temperaturas medias de 25°C - 30°C) y/o en cultivos ralos o poco frondosos.

- Si no tuviera experiencia o información previa sobre la acción del producto bajo las condiciones particulares de su cultivo, se recomienda que lo pruebe en pequeña escala, por ejemplo en una rama de un árbol o en parcelitas de 2m² - 5m² antes de proceder a la aplicación comercial.