

19 cm

19 cm

SPONSOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil	720 g/Kg
Cymoxanil	80 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1Kg

PQUA N° 552 - SENASA



**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **1Kg**
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado en las primeras 12 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Chlorothalonil - Chloronitrile; Cymoxanil - Cyanoacetamide oxime.
En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y en caso de contacto con la piel lave con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación lleve a la víctima al aire fresco.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
Tratar sintomáticamente, no hay antídoto específico.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD 0801-1-0200 (Línea gratuita) o ESSALUD en línea al 411-8000 opción 4.
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos. Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretende aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **SPONSOR** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

SPONSOR se aplica una sola vez cuando de note la presencia de la enfermedad en el campo.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda hacer prueba de campo.

FITOTOXICIDAD:

SPONSOR no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/cil de 200L	Kg/Ha		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.90 - 1.00	1.8 - 2	7	0.01 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mildíu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.50 - 0.75	–	14	0.5 ⁽¹⁾ 0.5 ⁽²⁾
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.75 - 1.00	–	21	2 ⁽¹⁾ 0.2 ⁽²⁾
Vid (<i>Vitis vinifera</i>)	"Mildíu"	<i>Plasmopara viticola</i>	0.50	–	28	3 ⁽¹⁾ 0.2 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Azul" o "Hielo"	<i>Phytophthora capsici</i>	1.00	–	7	2 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Periodo de Carencia

(1)Chlorothalonil, (2)Cymoxanil

LMR: Límite Máximo de Residuos



23 cm

3.4 cm