14,6 ± 0,5

9,8 ± 0,5

24,4 ± 0,5

3,7

TRICHOSIL® 50 WP

***(Trichoderma harzianum* AP-001)**

FUNGICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Trichoderma harzianum AP-001 ..... 5 %
(Concentración de 2 x 10^8 ufc/g).
Aditivos ..... 95 %
Total 100.0%

FUNGICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Registro PBUA Nº 179-SENASA

Contenido Neto: **1 Kg**

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Silvestre Protección Vegetal

Titular de Registro : **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

Formulado por : **APPLIEDCHEM (Thailand) Co. Ltd.**
186 Mu 5 Soi Lardpracount 76, Ramintra Rd.,
Anusaowaree, Bangkhen, Bangkok 10220 Tailandia

Importado y Distribuido por : **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO **NO INFLAMABLE**

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TRICHOSIL 50 WP® es un fungicida biológico de uso agrícola LIGERAMENTE TÓXICO; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes medidas de precaución:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Consérvese el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Antídoto No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TOXICOLOGÍA

Oral aguda en ratas: > 500 mg/kg
Dermal aguda en ratas: > 1000 mg/kg

NOTA AL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"

TRICHOSIL® 50 WP

***(Trichoderma harzianum* AP-001)**

FUNGICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INDICATIVOS DE USO

TRICHOSIL 50 WP® es un fungicida biológico que contiene el hongo Trichoderma harzianum AP-001 (cepa patentada). Este hongo es eficaz contra una gama de hongos fitopatógenos de plantas en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde la germinación de las esporas hasta la esporulación. Los micelios de Trichoderma harzianum AP-001 se enrollan alrededor de las hifas de los hongos fitopatógenos, produciendo un estrangulamiento. Además, las hifas susceptibles son penetradas, por lo que colapsan y finalmente se desintegran.

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Antes de usar **TRICHOSIL 50 WP®**, disolver la cantidad a utilizar en 20 L de agua y dejarlo reposar durante 3 a 6 horas (o durante toda la noche) con la finalidad de que se activen las esporas; homogenizar y agregar la cantidad de agua restante para completar la dosis. Usar la mezcla inmediatamente. Aplicar en pulverizaciones al follaje asegurándose de lograr una cobertura total, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc,) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar las aplicaciones preventivamente (en condiciones medioambientales favorables al patógeno) antes de que se establezca el hongo o se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Puede hacerse una segunda aplicación a los 7 - 10 días después de la primera.

COMPATIBILIDAD

TRICHOSIL 50 WP® puede ser usado en mezcla con la mayoría de pesticidas, biopesticidas, fertilizantes, hormonas, etc, excepto con otros fungicidas cúpricos. Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida. Se recomienda acidificar el caldo fungicida.

FITOTOXICIDAD

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en los cultivos por exceso de uso de este producto.

Cuadro de usos: **"CUADRO DE USOS Y DOSIFICACIONES"**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	kg/cil 200 L		
PIMIENTO	"pudrición radicular"	*Phytophthora capsici*	8	2	No existen restricciones en la aplicación de **TRICHOSIL 50 WP®**	

LMR: Límite Máximo de Residuos. **PC:** Período de Carencia.

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

TRICHOSIL 50 WP® es un fungicida biológico de uso agrícola LIGERAMENTE TÓXICO; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes medidas de precaución:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un envase adecuado.
- Consérvese el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Antídoto No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TOXICOLOGÍA

Oral aguda en ratas: > 500 mg/kg
Dermal aguda en ratas: > 1000 mg/kg

NOTA AL COMPRADOR

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"

TRICHOSIL® 50 WP

***(Trichoderma harzianum* AP-001)**

FUNGICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Medidas en cm.