

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# Sulfa<sup>®</sup> 800 WG

Plus

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

#### Composición Química:

Azufre ..... 800 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

#### Registro PQUA N° 555 - SENASA

**Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:** NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing China

**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:

**Silvestre**  
Protección Vegetal

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar el contacto directo con la piel y la inhalación de vapores.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilice equipo de protección personal durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Este producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Este producto puede ser irritante a la piel, ojos y aparato respiratorio.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Inorgánico.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

Gránulos Dispersables (WG)  
FUNGICIDA AGRÍCOLA  
Plus  
Sulfa<sup>®</sup> 800 WG

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**SULFA PLUS<sup>®</sup> 800 WG** es un fungicida de contacto, usado para el control de la oidiosis en pimiento.

**SULFA PLUS<sup>®</sup> 800 WG** se emplea mezclado con agua. Preparar una pre-mezcla en un tercio del agua a utilizar, agitar bien; luego añadir más agua hasta completar el volumen final y agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea. Aplicar con cualquier equipo de pulverización terrestre, utilizando boquillas de cono hueco o lleno que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200 L	kg/ha		
PIMIENTO	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	3.0	3	50
PALTO	"Arañita roja"	<i>Oligonychus yothersi</i>	0.5	-	-	-

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Se recomienda máximo 3 aplicaciones por campaña, con intervalos de aplicación entre 10 ó 12 días.
- Realizar la aplicación en forma preventiva y cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

#### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

**SULFA PLUS<sup>®</sup> 800 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con productos altamente reactivos como ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD

**SULFA PLUS<sup>®</sup> 800 WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

