

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo Químico: Neonicotinoide.**
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no existe antidoto específico, el tratamiento es sintomático.

**En caso de emergencia llamar a los teléfonos:**

**ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200 (gratuito),**  
**CICOTOX 0800-13040 (gratuito).**  
**CISPROQUIM 0800-50847 (gratuito)/ 328-7398**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligro para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# SINCHI

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición:**

Thiamethoxam..... 250 g/kg  
Aditivos..... c.s.p 1kg

**Reg. PQUA N° 564 - SENASA**

**Titular de Registro:**

**SHARDA PERÚ S.A.C.**  
Calle Las Castañitas 138  
Urb. El Palomar, San Isidro  
Teléfono: 222 -2695

**Formulado por:**

**SHARDA CROP CHEM LIMITED**  
Dominic Holm, 29th Road Bandra (w)  
Mumbai-400050. INDIA  
Teléfono: (91) 22 6678 2800  
Fax: (91) 22 6678 2828

**Importado y distribuido por:**

**Silvestre**  
Protección Vegetal

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú  
Teléfono: (01)6173300  
Correo electrónico: [sec@silvestre.com.pe](mailto:sec@silvestre.com.pe)

**Contenido Neto: 25 Kg**

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

SINCHI es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

SINCHI se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará con la aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Aplicaciones al follaje**

| CULTIVO  | PLAGA                                 |                                 | DOSIS  |       | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
|          | Nombre común                          | Nombre científico               | g/200L | Kg/ha |           |           |
| Tomate   | Mosquilla de los brotes               | <i>Prodidiplosis longifolia</i> | 75     | 0.225 | 7         | 0.2       |
| Arroz    | Cigarrita del virus de la hoja blanca | <i>Sogatodes oryzicolus</i>     | 70     | -     | 14        | 0.3       |
| Vid      | Filoxera                              | <i>Viteus vitifoliae</i>        | -      | 0.5   | 21        | 0.4       |
| Pimiento | Mosca Blanca                          | <i>Bemisia tabaci</i>           | 70     | -     | 3         | 0.5       |

**Aplicaciones al suelo tipo "drench" y al sistema de riego por goteo**

| CULTIVO  | PLAGA               |                             | DOSIS Kg/ha | MÉTODO                                                                                                                                 | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|          | Nombre común        | Nombre científico           |             |                                                                                                                                        |           |           |
| Arándano | Mosca Blanca        | <i>Bemisia tabaci</i>       | 1.0         | En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente. | 3         | 0.01      |
| Vid      | Cochinilla harinosa | <i>Planococcus citri</i>    | 1.0         |                                                                                                                                        | 21        | 0.4       |
| Palto    | Queresa             | <i>Floricaria floriniae</i> | 1.0         |                                                                                                                                        | 3         | 0.4       |

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

P.C.: Período de carencia (días)

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN:**

El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.

**PERÍODO DE REINGRESO:**

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

