LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
- **Grupo Químico: Neonicotinoide.**
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a los teléfonos:
ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200 (gratuito),
CICOTOX 0800-13040 (gratuito).
CISPROQUIM 0800- 50847 (gratuito)/ 328-7398

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligro para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SINCHI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:
Thiamethoxam…..…….. 250 g/kg
Aditivos…….…..…..... c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° 564 - SENASA

Titular de Registro:
SHARDA PERÚ S.A.C.
Calle Las Castañitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222 -2695

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
Prime Business Park, Dashrathlal
Joshi Road, Vile Parle (W),
Mumbai - 400 056 - INDIA
Telf: (91) 22 6678 2800
Fax: (91) 22 6678 2828

Importado y distribuido por:
Silvestre Protección Vegetal
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú
Teléfono: (01)6173300
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Contenido Neto: 25 Kg

Lote Nº :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
SINCHI es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

SINCHI se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará con la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Aplicaciones al follaje

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	Kg/ha		
Tomate	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	75	0.225	7	0.2
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	*Sogatodes oryzicolus*	70	-	14	0.3
Vid	Filoxera	*Viteus vitifoliae*	-	0.5	21	0.4
Pimiento	Mosca Blanca	*Bemisia tabaci*	70	-	3	0.5
Mandarina	Queresa coma	*Lepidosaphes beckii*	50	-	28	0.5

Aplicaciones al suelo tipo "drench" y al sistema de riego por goteo

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	MÉTODO	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha			
Arándano	Mosca Blanca	*Bemisia tabaci*	1.0	En el caso de sistema de riego por goteo aplicar por medio de tanques de fertilización. Regar antes de aplicar y regar posteriormente.	3	0.01
Vid	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	1.0		21	0.4
Palto	Queresa	*Fiorinia fioriniae*	1.0		3	0.4

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm) **P.C.: Período de carencia (días)**

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN:
El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.
Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO:
No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO