

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Neonicotinóide.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir el vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
- En caso de contaminación dérmica, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Nota al médico: no existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA

SAMU: 106

SHARDA PERÚ SAC: 222 - 2695

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligro para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficiosos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

SINCHI

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Thiamethoxam..... 250 g/kg

Aditivos..... c.s.p 1kg

Reg. PQUA N° 564 - SENASA

Titular de Registro:
SHARDA PERÚ S.A.C.
Calle Las Cañanitas 138
Urb. El Palomar, San Isidro
Teléfono: 222 - 2695

Formulado por:
SHARDA CROPCHEM LIMITED
CHINA OFFICE
Room 1803, B Zone, Yuntong
building, No. 216 Qingguoxiang,
Changzhou, Jiangsu, CHINA
Telf: 0519-88172050

Importado y distribuido por:

Silvestre
Protección Vegetal

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 342 Miraflores, Lima 18 - Perú
Teléfono: 616 973388
Correo electrónico: seo@silvestre.com.pe

Contenido Neto: 25 Kg

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SINCHI es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

SINCHI se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará con la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Aplicaciones al follaje

CULTIVO	Nombre común	Plaga científico	Conc. g/250L	Kg/ha	PC (litros)	LNR (g/l)
Tarazona	Morongo de los Andes	Prodenia litorea	75	0.225	7	0.2
Ajo	Diaprita del ajo	Epiphyas postvittana	70	-	14	0.3
Vid	Phylloxera	Ultrixia vitifolia	-	0.5	25	0.4
Frutales	Trioxa Blanca	Sanjonia leucostoma	70	-	2	0.6
Mandarina	Trioxa Blanca	Sanjonia leucostoma	50	-	28	0.5

Aplicaciones al suelo tipo "drench" y al sistema de riego por goteo

CULTIVO	Nombre común	Plaga científico	Kg/ha	Método	PC (litros)	LNR (g/l)
Arroz	Monca Blanca	Diurina leucostoma	1.0	Indicase sistema de riego por goteo	2	0.01
Vid	Gonella fusca	Phylloxera vitifolia	1.0	Indicase sistema de riego por goteo	39	0.4
Palto	Quempe	Faenicia leucostoma	1.0	Indicase sistema de riego por goteo	3	0.4

L.N.R.: Litra de producto por hectárea (ppm)

P.C.: Porcentaje de cobertura (litros)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN:

El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.

Se recomienda realizar como máximo 1 aplicación por campaña por año.

PERÍODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo la dosis señalada en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

