

ARCUS® 90% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:

Methomyl.....900 g/Kg

Aditivos:.....c.s.p. 1Kg

Registro PQUA N° 512 - SENASA

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular del Registro:



INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C

Calle Jorge Vanderghen N° 315 Miraflores

Lima - Perú.

Tel.: (01) 422-5900

Fabricado y formulado por:
LTD.

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO.

Wanshi Town, Yixing City, Jiangsu Province,

China 214217. China.

Tel.: (86-510) 8785 1001

Fax.: (86-510) 8785 1537

Importado y distribuido por:



HORTUS S.A.

Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.

Telf. (01) 717-9040 / 717-9041

R.U.C. 20101637221

Contenido Neto: **1 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo o aspersión.
- No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas o forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación.
- Después de usar el producto retirar toda la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar urgente al paciente al centro médico más cercano. El antídoto es el sulfato de atropina que debe ser suministrado en dosis múltiples hasta que el paciente este atropinizado.
- Dosis inicial: 1 - 2 mg de sulfato de atropina vía intravenosa cada 10 a 20 minutos hasta que el paciente haya mejorado.
- En caso de ingestión, no induzca al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral o en una persona inconsciente.
- En contacto con los ojos, enjuagarlos con bastante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 0800-13040 (gratuito) / CISPROQUIM: 0800-50847 ó 0800-50876 / ESSALUD: 117 ó 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y deposítelo en lugares destinados por las autoridades para este fin.

- No utilice este envase para guardar alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéfico.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ARCUS 90% PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

ARCUS 90% PS se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar en las primeras etapas del cultivo. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ARCUS 90% PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:

ARCUS 90% PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Maíz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	400	7	0.1
Tomate	Gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	200	400	1	1
Pimiento	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	400	3	2
Espárrago	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200	-	1	2

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). **PC:** Período de Carencia en días.

