ARCUS® 90% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN:
Methomyl.....900 g/Kg
Aditivos:.....c.s.p. 1Kg

Reg. PQUA Nº 512 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Titular del Registro:
INAP Insumos Agrícolas Peruanos

INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C
Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa,
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: (01) 499-7831

Fabricado y formulado por: **YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO. LTD.**
Wanshi Town, Yixing City, Jiangsu Province,
China 214217. China.

Importado y distribuido por:
hortus

HORTUS S.A.
Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf. (01) 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Contenido Neto: **500 g**
N° de Lote:
Fecha de Formulación
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

ALTAMENTE PELIGROSO
TOXICO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Puede ser letal si es inhalado. No respire el polvo o aspersión.
-No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
-Usar guantes, máscara, gafas protectoras y mameluco con protector plástico durante la preparación y aplicación del producto.
-Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
-Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas o forrajes.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
-Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación.
-Después de usar el producto retirar toda la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Carbamatos
-En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar urgente al paciente al centro medico mas cercano. El antídoto es el sulfato de atropina que debe ser suministrado en dosis múltiples hasta que el paciente este atropinizado .
-Dosis inicial: 1 - 2 mg de sulfato de atropina vía intravenosa cada 10 a 20 minutos hasta que el paciente haya mejorado.
-En caso de ingestión, no induzca al vomito sin supervisión medica. No administrar nada por vía oral o en una persona inconsciente.
-En contacto con los ojos, enjuagarlos con bastante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Teléfonos de emergencia:
CICOTOX: (01) 328-7700 / ESSALUD: (01)411-8000 opción 4
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS: 499-7831

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Después de usar el contenido enjuague el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y depositelo en lugares destinados por las autoridades para este fin.
-No utilice este envase para guardar alimentos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéfico.
-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-Evitar que el producto se aplique en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ARCUS 90% PS es un insecticida carbamato sistémico de amplio espectro de acción.

ARCUS 90% PS se aplica con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme. Para su preparación llenar con agua hasta la mitad del tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda aplicar en las primeras etapas del cultivo.
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:
No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ARCUS 90% PS es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina o los compuestos de cobre.

FITOTOXICIDAD:
ARCUS 90% PS no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L	g/ha		
Maíz	Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	200	400	7	0.1
Tomate	Gusano ejército	*Spodoptera eridania*	200	400	1	1
Pimiento	Gusano Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	200	400	3	2
Espárrago	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150	-	1	2
	Trips	*Thrips tabaci*	200	-	1	2
	Spodoptera ochrea	*Spodoptera ochrea*	200	-	1	2
Palto	"Queresa"	*Fiorinia fioriniae*	200	-	1	2

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). **PC:** Período de Carencia en días.