

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.



**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS
TOXICOLÓGICAS
INFOSALUD 113**

**CICOTOX: (01) 328 - 7700
ESSALUD: (01) 411 - 8000, opción 4
INTEROC S.A. (511) 614-5100**

PE-URKAN-V01-20

Urkan®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

DIFLUBENZURON 70 g/L

METHOMYL 230 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 566 - SENASA

 **INTEROC**

Pasión por la innovación

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16. Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**Formulador:
INTEROC S.A.**
Km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/ha		
Maiz <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	21	0.05 (a) 0.02 (b)
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Caballada gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	-	15	0.05 (a) 1 (b)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Gusano medidor de la hoja	<i>Chrysodeixis Pseudoplusia includens</i>	0.4 - 0.5	-	21	0.05 (a) 1 (b)
Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Caballada gusano ejército	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	-	15	1 (a) 0.7 (b)

PC= Período de Carencia

(a) Diflubenzuron

(b) Methomyl

LMR= Límite Máximo de Residuos.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

