

8 cm

1.2 cm

Urkan®

INSECTICIDA AGRÍCOLA**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

COMPOSICIÓN:
Diflubenzuron 70 g/L
Methomyl 230 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 566 - SENASA**INTEROC @ CUSTER**

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500 ml
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

18 cm

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L	L/Ha		
Maíz (<i>Zea mays</i>)	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.4 - 0.5	0.8 - 1.0	21	0.05 ⁽¹⁾ 0.02 ⁽²⁾
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	—	15	0.05 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	"Gusano medidor de la hoja"	<i>Chrysodeixis (=Pseudoplusia) includens</i>	0.4 - 0.5	—	21	0.05 ⁽¹⁾ 1 ⁽²⁾
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Caballada (gusano ejército)"	<i>Spodoptera eridania</i>	0.4 - 0.5	—	15	1 ⁽¹⁾ 0.7 ⁽²⁾

PC: Período de Carencia
(1) Diflubenzuron, (2) Methomyl

LMR: Límite Máximo de Residuos

