

Kremex[®] 500 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kresoxim methyl 500 g / Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Número de Registro: PQUA N° 567 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

**SHANGHAI KELINON
AGROCHEMICAL CO., LTD**
1201, Jinling Int'1 Mansion, Ouyang Road, Hongkou.
CHINA

**Importador y
Distribuidor:**

CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Of. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido
Neto: **1 Kg**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.
Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, guantes, botas, mascarilla o tapaboca, y para reingresar al área tratada.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.
No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: ESTROBILURINAS

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
En caso de ingestión: si la víctima está conciente y alerta dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- 1. Peligroso para organismos acuáticos.
- 2. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- 3. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
- 4. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- 5. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- 6. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- 7. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE DE USO Y MANEJO

KREMEX 500 WG es un fungicida de acción preventivo y curativo.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida. El producto presenta estabilidad a pH entre 4 y 6.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		*PC (días)	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/200 L agua	Kg/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.15	0.3	21	0.05
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.08	0.2	21	0.05
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.05-0.06	---	14	1

* PC: Periodo de Carencia. **LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar KREMEX 500 WG (Kresoxim methyl) máximo 2 aplicaciones por campaña/año, cuando se observe la presencia de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD: El producto es incompatible con el Clorpirifos y con productos de fuerte reacción alcalina. Por lo demás es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

FITOTOXICIDAD: En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

