

Kremex[®] 500 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Kresoxim methyl 500 g / Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

Número de Registro: PQUA N° 567 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

OASIS AGROSCIENCE LIMITED.

Room 1510, N°500, Xinjian Road,
Shanghai CHINA

Importador y

CAPEAGRO S.A.C.

Distribuidor: Av. Benavides 2150. Ofic. 803

Miraflores - Lima

www.capeagro.com

N° de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido

Neto:

1 Kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos.
- Durante la manipulación y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, mascarilla o tapa boca, guantes y para reingresar al área tratada.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cambiarse, lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- Ningun envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, bien cerrado, etiquetado en un lugar fresco alejado del calor y bajo llave.
- No almacenar este producto en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: ESTROBILURINAS

- En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
- En caso de ingestión: Si la víctima está consciente y alerta, dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconsciente.No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.
- Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

- Después de usar el contenido destruya el envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KREMEX 500 WG, es un fungicida de acción preventivo y curativo.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida. El producto presenta estabilidad a pH entre 4 y 6.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar KREMEX 500 WG (Kresoxim methyl) máximo 2 aplicaciones por campaña / año, cuando se observe la presencia de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD:

El producto es incompatible con el Clorpirifos y con productos de fuerte reacción alcalina. Por lo demás es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios comúnmente usados.

FITOTOXICIDAD:

En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectado respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación.

Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		*PC (días)	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/Cilindro	Kg/ha		
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	0.15	0.3	21	0.05
	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.08	0.2	21	0.05
Paprika/Jalapeño/piquillo/ Vid	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	0.1-0.15	0.2 - 0.3	7	1
	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	0.05-0.06	--	14	1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	--	0.35	7	0.05
Melocotonero/Duraznero	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.06-0.08	--	1	0.05
Alcachofa	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	0.1-0.12	--	--	0.05
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.3	--	0.05
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.03-0.045	--	14	0.05
Mango	Oidio	<i>Oidium mangiferae</i>	--	0.2	48	0.05
Holantao	Oidio	<i>Erysiphe betae</i>	0.06-0.08	--	N.D	0.05
Manzana	Oidio	<i>Podospaera leucotricha</i>	0.04-0.06	--	35	0.2

* PC: Periodo de Carencia.

**LMR: Límite Máximo de Residuos.

N.D: No Determinado

