

TRIGGRR® KELP

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

Composición:

Citoquininas (como kinefina) 0,132 g/L
 Auxinas 0,050 g/L
 Aditivos C.s.p. 1L
Reg. PBUA N°232-SENASA

Titular del Registro:

FARMEX S.A.
 Calle Dean Valdivia N° 148, piso 07
 San Isidro, Lima-Perú



Formulado y distribuido por:
FARMEX S.A.
 Calle Dean Valdivia N°148, Piso 7,
 San Isidro, Lima-Perú,
 Teléfono: 630-6400.



N° de Lote:
 Fecha de Fab.:
 Fecha de Venc.:

CONTENIDO NETO

1 Litro

No corrosivo

No inflamable

No explosivo

LIGERAMENTE TÓXICO
 - PRECAUCIÓN -

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto.
- No coma, beba o fume durante su aplicación.
- Cambiense de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón.
- No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc.
- No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión.
- Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo.
- Se puede aplicar durante todo el ciclo del cultivo hasta el mismo día de la cosecha sin peligro de residuos indeseables.
- Los envases desocupados se deberán destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.

NOTA AL MEDICO

DL₅₀
 Oral aguda: > 2000 mg / Kg Dermal Aguda > 4000 mg / Kg

-Teléfonos de emergencia
 Essalud: 411 8000, anexo 04
 Infosud: 0800-10-828
 Cicotox: 0800-1-3040, 3287700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en el tanque de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre
- Peligroso para los peces
- No contaminar ríos, rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Nocivo para la fauna benéfica
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TRIGGRR®KELP es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para incrementar los rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas. Contiene citoquininas mas auxinas sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos menores quelatizadores; indispensables para el óptimo metabolismo de las plantas.
 - El contenido de auxinas estimula la formación de raíces en las plantas tratadas. La mayor cantidad de raíces aumenta la absorción de nutrientes y el desarrollo foliar.
 - TRIGGRR®KELP, es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla. **AGITAR FUERTEMENTE EL ENVASE ANTES DE ABRIRLO.** Medir la cantidad recomendada y diluirlo con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

Cuadro de usos

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	L/Ha	Lc/lit*	
Pimiento	1	1	Aplicar a los 30 días después del trasplante La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera aplicación.
Cebolla	1	1	Aplicar a los 15 días después del trasplante La segunda aplicación a los 15 días después de la primera aplicación.
Frijol	0,5	-	Aplicar a los 20 días después de la siembra y la segunda a los 15 días después de la primera.
Arroz	-	0,5	Aplicar a los 15 a 45 días después del trasplante, durante el macollamiento.
Papa	-	0,5	Aplicar a los 30 a 42 días después de la emergencia del brote, para promover el desarrollo radicular.
Vid	-	0,5	Aplicar durante el crecimiento de las bayas, cuando estén entre 8 a 10mm.

*Volumen de aplicación promedio 1 cilindro/Ha.
 Frecuencia y época de aplicación:

Se aplica 15 a 20 días después del trasplante o siembra en pimiento, cebolla y frijol, en arroz durante el macollamiento y en papa durante el crecimiento vegetativo. Es necesario calibrar el equipo para aplicar la dosis correcta por hectárea.
 Periodo de reintegro

No reintegrar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación.

Compatibilidad

Es compatible con otros productos de control biológico registrados, insecticidas y fungicidas, fertilizantes compuestos por NPK, ácidos húmicos y fúlvicos.

TRIGGRR®KELP puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de TRIGGRR®KELP y del otro plaguicida o sustancia afín. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos. La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos

Fitotoxicidad

TRIGGRR®KELP no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado a las dosis recomendadas.

Responsabilidad Civil:

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

