

PROYECTO DE ETIQUETA – Presentación 500 ml

<p style="text-align: center;">LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p> <p style="text-align: center;">PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN</p> <p>PRECAUCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Use guantes, overol, protector de ojos y rostro. No aspire la neblina del producto. -No coma, beba o fume durante su aplicación. -Cámbiese de ropa después de aplicar el producto. Lávese con abundante agua y jabón. -No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc. -No ingerir el producto y evite el contacto con la piel y ojos, y la inhalación de la aspersión. -Almacenar el producto en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa. Las temperaturas debajo de 0 °C y arriba de 46 °C pueden deteriorarlo. -No arrojar los sobrantes ni lavar los equipos de aplicación en acequias, riachuelos, canales de regadío, etc. -Los envases desocupados se deberá destruir de manera que queden inservibles y su eliminación final deberá ser la aprobada por la respectiva autoridad local. <p>PRIMEROS AUXILIOS</p> <p>Si este producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos, mientras se obtiene atención médica.</p> <p>Teléfonos de emergencia: Aló ESSALUD: 411 8000 / 0801-10200 (línea gratuita). CICOTOX: 328-7398 / 0800-13040 (línea gratuita).</p> <p>NOTA AL MEDICO</p> <p>DL₅₀ - Oral aguda:> 2000 mg / Kg / Dermal Aguda:> 4000 mg / Kg</p> <p style="text-align: center;">NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO</p> <p>NOTA AL COMPRADOR "EL vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso siguiendo las instrucciones dadas".</p>	<p>TRIGGRR® KELP (Citoquininas+Auxinas)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS</div> <p>CONCENTRADO SOLUBLE - SL</p> <p>Composición Química: Ingrediente activo: Citoquininas (como kinetina).....0.132 g/L Auxinas.....0.050 g/L Aditivos.....c.s.p.....1L</p> <p>Reg. N°:</p> <p>CONTENIDO NETO 500 mL</p> <p>Titular del Registro: FARMEX S.A.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Formulado y distribuido por: FARMEX S.A. Calle Dean Valdivia N° 148, Piso 7, San Isidro, Lima-Perú. Teléfono: 630-6400.</p> </div> <p>N° de Lote: Fecha de Fab.: Fecha de Venc.:</p>	<p>INDICACIONES DE USO:</p> <p>TRIGGRR®KELP, es un regulador de Crecimiento de Plantas que se aplica al follaje para incrementar rendimientos y mejorar la calidad de las cosechas. Contiene citoquininas mas auxinas sustancias biológicas naturales balanceadas y elementos menores quelatizados; indispensables para el óptimo metabolismo de las plantas.</p> <p>El contenido de auxinas, estimula la formación de raíces en las plantas tratadas. La mayor cantidad de raíces aumenta la absorción de nutrientes y el desarrollo foliar.</p> <p>SISTEMAS DE PREPARACION Y APLICACIÓN</p> <p>TRIGGRR®KELP, es un concentrado soluble que se diluye en el agua; para preparar la mezcla, agitar fuertemente el envase antes de abrirlo. Medir la cantidad recomendada y diluirla con suficiente cantidad de agua para luego llevar el volumen o concentración deseada. La mezcla debe usarse dentro de las doce (12) horas posteriores a su preparación.</p> <p>USOS ESPECIFICOS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cultivo</th> <th colspan="2">Dosis</th> <th rowspan="2">Momento de aplicación</th> </tr> <tr> <th>L/Ha</th> <th>L/200L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pimiento</td> <td>1</td> <td>1L/200L</td> <td>Aplicar a los 30 días después del trasplante La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera</td> </tr> <tr> <td>Cebolla</td> <td>1</td> <td>1L/200L</td> <td>Aplicar a los 20 días después del trasplante La segunda aplicación a los 30 días después de la primera aplicación.</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Volumen de aplicación promedio, 1 cilindro/Ha.</small></p> <p>TRIGGRR®KELP puede ser mezclado con insecticidas o fungicidas. Para comprobar la compatibilidad, mezclar en un recipiente cantidades proporcionales diluidas de TRIGGRR®KELP y el otro plaguicida o sustancia afin. Agitar la mezcla y dejar reposar durante quince (15) minutos.</p> <p>La formación de un precipitado que no se dispersa indica la incompatibilidad de los productos.</p>	Cultivo	Dosis		Momento de aplicación	L/Ha	L/200L	Pimiento	1	1L/200L	Aplicar a los 30 días después del trasplante La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera	Cebolla	1	1L/200L	Aplicar a los 20 días después del trasplante La segunda aplicación a los 30 días después de la primera aplicación.
Cultivo	Dosis			Momento de aplicación												
	L/Ha	L/200L														
Pimiento	1	1L/200L	Aplicar a los 30 días después del trasplante La segunda aplicación es a los 30 días después de la primera													
Cebolla	1	1L/200L	Aplicar a los 20 días después del trasplante La segunda aplicación a los 30 días después de la primera aplicación.													



LIGERAMENTE TÓXICO
- PRECAUCIÓN -

