"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO'

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y API ICACIÓN

DK-DATE, es un nematicida de formulación Concentrado Soluble. Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaquicidas:

- Utilice respirador y ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Producto inflamable, almacenar en ambiente fresco y leios de material combustible.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamato.
- En caso de ingestión proporcione 1 ó 2 vasos de agua e induzca al vómito. llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta v/o Hoia de Seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua limpia por mas de 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua viabón. Llame a un médico.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: Efectuar un lavado gástrico y dar tratamiento sintomático y de recuperación.
- ANTÍDOTO: Aplicar 1 2 mg de Sulfato de Atropina por vía intramuscular o intravenosa

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Es TÓXICO para peces y otros organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estangues o arrovos v drenajes con los desechos y envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia bordes de agua de al menos 5
- Peligroso para animales domésticos.
- Es ALTAMENTE TÓXICO para flora y fauna silvestre.
- No aplicar en floración de cultivos o maleza cuando haya abejas en el
- No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el acarreo o deriva del producto a otras áreas.
- No permitir la presencia de animales al área tratada.
- EXTREMADAMENTE TÓXICO para abeias.
- Evitar el uso del producto en zonas con napa freática superficiales.
- El aplicador debe aplicar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

NEMATICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Oxamyl	240	g/L
Aditivosc.s	.p. `	1L

Registro PQUA Nº 137 - SENASA

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991 Piso 9. Magdalena del Mar Lima - Perú. Teléfono: 501-1000



FABRICADO Y FORMULADO POR:

KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.

9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone Biniiang Hangzhou, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 500 ml



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

DK-DATE es un nematicida sistémico del grupo de los Carbamatos, soluble en agua a base de Oxamyl que controla nemátodes cuando se aplica al suelo o a la base de los tallos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

DK-DATE se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar. RESPETAR EL PERIODO DE CARENCIA.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	L/200 L	días	ppm
FRIJOL	Nemátodo del nudo	Meloidogyne incognita	1.6	0.8	14	0.2
PAPA	Nemátodo del nudo	Meloidogyne incognita	1.0*	-	1	0.01
APIO	Nemátodo del nudo	Meloidogyne incognita	-	1.0*	3	0.01
PIMIENTO (páprika, piquillo, morrón)	Nemátodo del nudo	Meloidogyne incognita	0.75 - 1.0	-	7	0.02
AJO	Nemátodo del bulbo	Ditylenchus dipsaci	-	1.0	14	0.01
TOMATE	Nemátodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	1.0		3	2

PC: Período de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO, DE API ICACIÓN

Frijol: se recomienda realizar sólo una aplicación por campaña y efectuarla al inicio de la infestación de la plaga.

Papa: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/ha). con un intervalo de 14 días. Apio: Realizar 2 aplicaciones por campaña (cada una de 1 L/200 L), con un intervalo de 14 días.

PERÍODO DE REINGRESO No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD DK-DATE, es compatible con la gran mayoría de los insecticidas y pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"



























LMR: Límite máximo de residuos





^{*} Se recomienda 2 aplicaciones