

15 cm

15 cm

INVICTO®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Acephate	450 g/Kg
Imidacloprid	250 g/Kg
Aditivos	csp 1 Kg

PQUA N° 484 - SENASA

INTEROC @ CUSTER

**Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:**
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú



Formulador:
**SINOCHEN NINGBO
CO., LTD**
21 Jiangxia St.
Ningbo Province. China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **250 g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Causa irritación al tracto respiratorio. Es peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo de la mezcla de aspersión. Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora y equipo de protección: anteojos, respirador, guantes, botas y overol durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada hasta que la aspersión se haya secado después de las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Acephate (Organofosforado); Imidacloprid (Neonicotenoide). En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de intoxicación por inhalación remover al individuo para que respire aire fresco, dar respiración artificial si es necesario. En caso de intoxicación por ingestión lavar los residuos remanentes de la boca, no induzca al vómito ni de nada de beber a personas en estado de inconsciencia. En caso de contacto con la piel o ropa lavar con abundante agua y jabón, remover la ropa contaminada y lavarla después de usarla. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos y consulte a un médico.

Nota al médico: usar ATROPINA como antídoto, también se puede usar 2-PAM (pralidoxima) junto con la atropina, pero jamás solo.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD: 411-8000
opción 4. Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar en cultivos aledaños o sobre malezas. Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes o noches. Evitar la deriva por el viento. Peligroso para organismos acuáticos.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. No contaminar estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables. En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

INVICTO® es un insecticida formulado a base de dos ingredientes activos, Acephate e Imidacloprid, los cuales les confieren una alta capacidad sistémica, de contacto e ingestión.

INVICTO® es tomado por las raíces y absorbido a través de las hojas de las plantas.

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que se pretenda aplicar. Colocar en un cilindro de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **INVICTO®** de acuerdo a la dosis recomendada, agitar. Finalmente adicionar el resto de agua y volver a agitar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para las plagas recomendadas en arroz, cebolla, pimiento, algodón, tomate y papa, realizar 2 aplicaciones de **INVICTO®** considerando 1 campaña al año. Para las plagas recomendadas en sandía y frijol, realizar 1 aplicación de **INVICTO®** considerando un máximo de 1 campaña al año. El momento de aplicación se realizará cuando se presenten los estadios iniciales de la plaga en todos los cultivos que se recomiendan.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada en las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

El producto es incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes. En caso de dudas se recomienda efectuar previamente una muestra de compatibilidad física a la dosis recomendada.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	(g/cil de 200L)	(g/Ha)		Acephate	Imidacloprid
Arroz	“Mosca Minadora”	<i>Hydrellia wirthi</i>	250	250	40	0.02	0.05
Cebolla	“Thrips”	<i>Thrips tabaci</i>	200 - 250	--	21	0.02	0.1
Sandía	“Mosca blanca”	<i>Bemisia tabaci</i>	200 - 250	--	21	0.02	0.2
Pimiento	“Mosquilla o caracha”	<i>Prodiplasis longifila</i>	200 - 250	--	7	0.02	1
Algodón	“Pulgón del algodónero”	<i>Aphis gossypii</i>	150	--	28	0.05	1
Tomate	“Mosquilla o caracha”	<i>Prodiplasis longifila</i>	200 - 250	--	14	0.02	0.5
Papa	“Mosquilla o caracha”	<i>Prodiplasis longifila</i>	200 - 250	--	30	0.02	0.5
Frijol	“Gusano picador de la hoja”	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>	200 - 250	--	21	0.02	2

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos



22 cm

3.3 cm