

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación por aspersión de aplicación, gotas o vapores.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugar fresco y seco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada separada de la ropa de casa.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manejo y aplicación por personal capacitado.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Fenilpirazoles

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa.
- Solo si el paciente está conciente provocar el vomito, asegurando las vías respiratorias, tratamiento con carbón activado podría sustituir al lavado gástrico.
- No administrar leche, alcohol o sustancias grasas. No inducir al vómito, no administrar nada a una persona inconsciente.
- Realizar tratamiento médico sintomático. El Fenobarbital y Diazepam pueden ser útiles para prevenir probables convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón, con atención médica requerida.
- En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar abierto y proporcionarle aire fresco, despejar las ropas alrededor del cuello y el pecho. Brindar respiración artificial.
- No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.
- **Carbono Activado:** la dosis recomendada es de 25 - 100 gr en adultos/adolescentes y de 25 - 50 gr en niños (1 a 11) y de 1 gr/kg en infantes menores de 1 año.
- Para intoxicación inhalatoria administrar oxígeno y ventilación asistida, en caso de espasmos broncopulmonares tratarlos con el agonista beta 2 para inhalar y corticoides.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0- 800 -1 -3040 ESSalud (línea gratuita): 0801-10200 ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4: consultoría médica - Cia de Bomberos (Emergencias)

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas, debe usarse para conservar alimentos o agua para beber.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas o artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Xipronil[®]

20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil 200 g/L
 aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 366 - SENASA

Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.
 Calle El Galeón 180 Urb La Calessa - Lima 33 - Perú.
 Telf.: (01) 271-3366 - Fax: (01) 271-1988
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

POINT INTERNATIONAL LTD.
 Great Rollright, Chipping Norton Oxfordshire OX7
 5RE, Inglaterra
 Tel.: 44 - 1608730191 / Fax: 44- 1608737715

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.
 Calle El Galeón 180 Urb La Calessa, Lima 33 - Perú.
 Telf.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
 F. de Form:
 F. de Venc:
 ® Marca registrada

Contenido Neto: 4L

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

XIPRONIL 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.

XIPRONIL 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

XIPRONIL 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml Cil de 200 L	ml / ha		
Algodón	“Áfido ó pulgón”	<i>Aphis gossypii</i>	150-200	300-400	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

XIPRONIL 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

