

21.3 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- El producto causa irritación moderada a los ojos. Evitar el contacto con los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, así como la inhalación por aspersión de aplicación, gotas o vapores.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Guardar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado. En un lugar fresco y seco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada separada de la ropa de casa.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No re - envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Manejo y aplicación por personal capacitado.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX**: 0- 800 -1 -3040 **ESSALUD** (línea gratuita): 0801-10200
- ESSALUD** en línea 411- 8000, opción 4: consultoría médica - Cia de Bomberos (Emergencias)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución de mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



Xipronil[®]

20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)
COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil 200 g/L
aditivos c.s.p..... 1 L

Reg. PQUA N° 366 - SENASA
Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalciente@grupandina.com.pe

Formulado por:

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750,
Jinan, Shandong, China.
Fax: +86 - 531 - 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú

Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988

atencionalciente@grupandina.com.pe

Loté N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada
NO CORROSIVO
NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO
**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**
**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

XIPRONIL 20 SC es un insecticida fenilpirazol de acción sistémica y de amplio espectro; que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual sobre insectos del suelo y follaje.

XIPRONIL 20 SC se emplea diluido en agua; preparar una pre - mezcla de acuerdo a la dosis recomendada, en un tercio del volumen de agua a utilizar. Agitar bien y completar el volumen de agua de aplicación.

XIPRONIL 20 SC puede ser aplicado con cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, parihuelas, etc.). Antes de iniciar la aplicación, asegurarse que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml ca. de 200 L	ml / ha		
Algodón	"Árido ó pulgón"	<i>Aphis gossypii</i>	150-200	300-400	21	0.005
Papa	"Gorgojo de los Andes"	<i>Premnotypes Suturicallus</i>	250	—	14	0.01
Pimiento	"Caracha" (Mosquilla de los brotes)	<i>Prodidiplosis longifolia</i>	200	400	21	0.005

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación de **XIPRONIL 20 SC**. También dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y la época de siembra. Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

XIPRONIL 20 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común; sin embargo, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con los productos a utilizar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

