

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
  - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
  - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
  - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
  - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - El producto puede ser nocivo por contacto, ingestión e inhalación.
- PRIMEROS AUXILIOS:**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.
  - Su ingestión produce síntomas de intoxicación como hipoactividad, decaimiento, ligera descoordinación muscular y ligero ensanchamiento del abdomen.
  - La inhalación del polvo en un área cerrada, puede ocasionar irritación y congestión del tracto respiratorio superior.
  - En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**ANTÍDOTO:** No tiene antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX: Telf. 0-800-1-3040**(Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental)-Atención 24 horas.

**ATENCIÓN AL CLIENTE: Tecnología Química y Comercio S.A. Telf.:(01) 348-1103.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
  - Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
  - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
  - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

® Marca Registrada por Nihon Nohyaku Co.,Ltd

# APPLAUD®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE - WP

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Buprofezin..... 250 g/kg

Aditivos..... 750 g/kg

Reg. Nº 166-96-AG-SENASA

**Titular del Registro, Importador y Distribuidor:**

**Tecnología Química y Comercio S.A.**

Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12

Urb. Santa Raquel 2<sup>da</sup> Etapa, Ate. Lima- Perú.

Telf.: 348 -1103, Fax: 348 -1020

R.U.C N° 20307150981

**Fabricado por:**

**Nihon Nohyaku Co.,Ltd**

1-2-5 Nihonbashi, Chuo-ku

Tokyo 103, Japón

Telf.: 81-3-3278-0461

Nº Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1Kg**

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** APPLAUD es un insecticida inhibidor de síntesis de quitina, que actúa por contacto e ingestión, con buen efecto residual. Controla eficazmente los estados inmaduros (ninfas) de insectos como mosca blanca, queresas. Además, produce una elevada infertilidad en los adultos tratados. Respeta el control biológico y las abejas, por lo que se recomienda para programas MIP. **APPLAUD** se aplica en pulverizaciones en mezcla con agua, siendo recomendable hacer una pre-mezcla en un volumen menor de agua. Aplicar con equipos de aspersión terrestre, en forma uniforme.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**USO ESPECIFICO Y DOSIS:**

| CULTIVO                        | PLAGAS                                      |                                                                       | DOSIS<br>g/cil.<br>200 L | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                                | NOMBRE COMÚN                                | NOMBRE CIENTÍFICO                                                     |                          |                |                 |
| CÍTRICOS                       | "Queresa coma"                              | <i>Lepidosaphes beckii</i>                                            | 200                      | 14             | 0,5             |
|                                | "Queresa redonda"                           | <i>Selenaspidus articulatus</i>                                       | 200                      |                |                 |
|                                | "Mosca blanca"                              | <i>Aleurothrixus floccosus</i>                                        | 100                      |                |                 |
| OLIVO                          | "Queresa negra"                             | <i>Saissetia oleae</i>                                                | 200                      | 15             | N.D.            |
|                                | "Queresa parda"                             | <i>Saissetia coffeae</i>                                              | 200                      |                |                 |
|                                | "Queresa blanca móvil"                      | <i>Orthozia olivicola</i>                                             | 200                      |                |                 |
| PAPA, TOMATE, FRIJOL, MARYGOLD | "Mosca blanca"                              | <i>Bemisia tabaci</i>                                                 | 170                      | 1              | 1               |
| MANZANO, MELOCOTONERO          | "Piño Blanco"                               | <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>                                      | 200                      | 15<br>21       | 0,5<br>1        |
| MANZANO                        | "Cochinilla harinosa"<br>"Piño de San José" | <i>Pseudococcus longispinus</i><br><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> | 150-200<br>150-200       | 15             | 0,5             |
| TUNA (*)                       | "Queresa de la tuna"                        | <i>Diaspis echinocacty</i>                                            | 100-200                  | N.D.           | N.D.            |
| PECANO                         | "Mosca blanca"                              | <i>Aleurodicus dispersus</i>                                          | 100                      | N.D.           | 0,1             |
| ALGODONERO                     | "Mosca blanca"<br>"Cochinilla harinosa"     | <i>Aleurotrachelus trachoides</i><br><i>Phenacoccus gossypii</i>      | 100<br>100               | N.D.           | N.D.            |
| PALTO                          | "Mosca Blanca"<br>"Queresa del patto"       | <i>Aleurodicus cocois</i><br><i>Fiorinia florinae</i>                 | 200-300<br>200-300       | N.D.           | 0,5             |
| PAPRIKA                        | "Mosca blanca"                              | <i>Bemisia tabaci</i>                                                 | 200                      | N.D.           | 0,5             |
| GRANADO                        | "Piño harinoso"                             | <i>Planococcus citri</i>                                              | 200                      | N.D.           | 0,05            |
| MANGO                          | "Queresa tortuga"                           | <i>Ceroplastes floridensis</i>                                        | 150-200                  | 15             | 0,1             |
| BROCOLI                        | "Mosca Blanca"                              | <i>Bemisia tabaci</i>                                                 | 200                      | 3              | 0,05            |

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.D. = No determinado

(\*) No afecta la "cochinilla del carmín" establecida en el cultivo.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** Cultivos bajos: 400 a 600 L/ha - Frutales: 1 000 a 2 000 L/ha.

**ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:** Realizar las aplicaciones cuando se observe la presencia de la plaga. Repetir en caso sea necesario, usualmente en intervalos de 14 días.

**PERIODO DE REINGRESO:** 24 horas.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos recomendados a las dosis indicadas.

**COMPATIBILIDAD:** Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”



## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

