

14,0 ± 0,2

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

**VACOMIL-PLUS 50®** es un fungicida de baja toxicidad; sin embargo, durante su manejo se recomienda tomar las siguientes precauciones básicas:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y/o semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado; no reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realizar la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lávese con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX 0-800-1-3040  
SILVESTRE (01) 617-3300

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase (bolsa interna) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe usarse para conservar alimentos o agua potable.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para los zoonimales domésticos, manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos dos días después de realizada la aplicación.
- Peligroso para las abejas.
- Peligroso para los peces; no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los lugares

destinados por las autoridades locales para este fin.

- No arrojar restos de la aplicación o sobrantes del producto, ni lavar el equipo o ropa utilizada en la aplicación en lugares cercanos a fuentes de agua.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VACOMIL-PLUS 50®** es un fungicida sistémico de formulación polvo mojable compuesto por dos ingredientes activos oxiclورو de cobre (fungicida de contacto) y metalaxyl (fungicida sistémico), que le brindan un efecto protector y curativo. Se recomienda usar **VACOMIL-PLUS 50®** para el control de hongos endoparasitos (oomycetos) causantes de enfermedades en plantas cultivadas.

**SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN**

**VACOMIL-PLUS 50®** se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje, suelo o cuello de planta según la plaga a controlar, empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad en el cultivo y si las condiciones son de alta humedad en el suelo.
- Se recomienda realizar hasta tres aplicaciones por campaña.
- Hacer una segunda aplicación 10 - 14 días después de la primera; sin embargo, si la incidencia del hongo es alta y las condiciones climáticas son frías realizar la segunda aplicación entre 7 y 10 días después.

**COMPATIBILIDAD**

**VACOMIL-PLUS 50®** es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común; a excepción de los mercuriales, thiram, cal, azufre y ditiocarbamatos. Se recomienda realizar una prueba previa en caso de no conocerse su compatibilidad con otro plaguicida.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**FITOTOXICIDAD**

**VACOMIL-PLUS 50®** no es fitotóxico para los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

# VACOMIL - PLUS 50®

## FUNGICIDA AGRICOLA

### Polvo Mojable (WP)

**Composición Química:**

Metalaxyl.....	150 g/kg
Oxicloruro de cobre.....	350 g/kg
Aditivos.....	500 g/kg

**Registro N° 994 - 2001 - AG - SENASA**

Contenido Neto: **100 g**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312

Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

**Formulado por:**

**VAPCO LTD.**

P.O. Box 17058 Amman 11195, Jordania.

**Importado, Envasado  
y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

¡INFLAMABLE!

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

BOLSA TRILAMINADA ALUMINIO (ETIQUETA)

14,5 ± 0,2

**Cuadro de usos:**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/cil 200L	kg/ha		
ALCACHOFA	"Mildiu"	<i>Bremia lactucae</i>	0,5	1,0	15	0,05
CEBOLLA	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0,35 - 0,5	0,7 - 1,0	15	0,5
PALTO	"Pudrición radicular"	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	1,0 - 2,0	-	Nd	0,05
PAPA	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	0,35 - 0,5	0,7 - 1,0	15	0,05
PÁPRIKA	"Ranchar"	<i>Phytophthora infestans</i>	0,5*	1,0	7	0,05
	"Hielo azul"	<i>Phytophthora capsici</i>	0,5*	1,0	7	0,05
PIQUILLO	"Hielo azul"	<i>Phytophthora capsici</i>	0,75** 1,0	1,5 - 2,0	7	0,05
	VID	"Mildiu"	<i>Plasmopara viticola</i>	-	0,25 - 0,65	28

LMR: Límite Máximo de Residuos \* Aplicar dosis de 0,8 kg/cil 200 litros en infestaciones altas \*\* Aplicar dosis de 0,5 kg/cil 200 litros en infestaciones bajas PC: Período de Carencia.



Medidas en cm.