

Diagram of a pesticide label for Intenso 500 WG fungicide, showing dimensions and layout. The label is divided into four main sections: top (product name and logo), middle (composition and registration), bottom (usage instructions and safety), and right (usage instructions and safety). Dimensions are provided for the label and the product container.

Dimensions:

- Top section: 14,0 ± 0,5 (width), 9,5 ± 0,5 (height)
- Bottom section: 3,5 (height)

Label Content:

Top Section:

- Intenso 500 WG
- FUNGICIDA AGRÍCOLA
- Gránulos Dispersables (WG)

Middle Section:

- Composición: Azoxystrobin 500 g/kg, Aditivos c.s.p 1kg
- Registro PQUA N° 582-SENASA
- ITAGRO logo
- Titular del Registro: INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A., Av. Javier Prado Este Nro. 6210, Int. 201 (Edificio Park Office La Molina), La Molina, Lima - Perú, Tel: +51 349-6805 / www.itagro.com.pe
- Importado y Distribuido por: INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A., 7 Huanyang East Road, Jixi County, Anhui Province, CHINA.
- Formulado por: JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD., 7 Huanyang East Road, Jixi County, Anhui Province, CHINA.
- Contenido Neto: 600 g (15 sobres de 40 g c/u)
- N° de Lote: F. de Form: F. de Venc:
- NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Bottom Section:

- LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO
- Safety icons: Pesticide, Gloves, Boots, Mask, Eye Protection, No Food/Drink, No Smoking, No Open Flame, No Disposal in Water.

Right Section:

- LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
- INTENSO 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. INTENSO 500 WG actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual. MODO DE EMPLEO: Es empleado a través de aplicaciones foliares. Se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por hectárea.
- "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"
- Table with 6 columns: CULTIVO, NOMBRE COMÚN, NOMBRE CIENTÍFICO, DOSIS (Kg/ha, g/200 L), PC (días), LMR (ppm). Rows include: ALCACHOFA, ARROZ, CEBOLLA, ESPÁRRAGO, MAÍZ, MANGO, PIMIENTO/PIÑULLO, VID.
- FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña. Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas MIP.
- PERIODO DE REINGRESO: Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.
- COMPATIBILIDAD: INTENSO 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni clorpirifos.
- FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.
- RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.
- LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.

Caja de cartón

NO CORROSIVO **NO INFLAMMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Importado y Distribuido por:
INDUSTRIA TECNOLÓGICA
AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.



Gránulos Dispersables (WG)

Gránulos Dispersables (WG)

FLUENGICIDA AGRÍCOLA A

Intenso
500 WG

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **INTENSIO 500 WG** es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translocar por propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares. **INTENSIO 500 WG** actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual. **INTENSIO 500 WG** es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium. **INTENSIO 500 WG** se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por hectárea.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LPM (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/200 L		
ALCACHOFA	"Oidiosis"	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	-	7	1
ARROZ	"Piricularia"	<i>Piricularia oryzae</i>	0.08	80	7	5
CEBOLLA	"Mancha foliar"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2	80	14	0.05
ESPÁRRAGO	"Mancha foliar"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2	100	7	0.04
MAÍZ	"Mancha negra del maíz"	<i>Phyllachora maydis</i>	-	100	7	0.03
MANGO	"Oidiosis"	<i>Oidium mangiferae</i>	0.2	-	10	0.7
PIMIENTO PIQUILLO	"Ceniza"	<i>Leveillula taurica</i>	0.12-0.2	60 - 100	3	2
VID	"Oidium"	<i>Uncinula necator</i>	0.2	-	14	1

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña. Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas MIP.

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

INTENSO 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni clorpirifos.

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.

Caja de cartón