

Aplicar el producto al notar los primeros síntomas de la enfermedad, presentes en el cultivo, o cuando exista una alta presión de la enfermedad.

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar sustancias fuertemente alcalinas o ácidas. Se recomienda realizar preliminares para evaluar la compatibilidad física - química y biológica de los productos.

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

PESO MOLECULAR: 265.9

COVERT® es un fungicida de contacto foliar, no sistémico con acción protectora y de amplio espectro. Su acción consiste en la combinación de chlorothalonil con una molécula que se encuentra presente en los hongos llamada glutatone. Resultan en la disrupción de ciertas funciones esenciales que dependen del glutatone y causando efectos tóxicos en el hongo.

COVERT® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/cil de 200L)	PC (días)	LPMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	400	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	400 - 600	7	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	400 - 500	7	0.01
	"Cercosporiosis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	400 - 500	7	0.01
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 700	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	21	2
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	400 - 500	7	2

LMR = Límite Máximo de Residuos



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

1.2 cm

Lima - Perú.

con abundante agua y jabón. Consultar al médico en caso de que aparezca irritación.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: 614-5100

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase (botella de plástico) y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.



Lavado de equipo de aplicación: es recomendable que la limpieza y Preparación de los equipos de aplicación sean llevados a cabo por la persona responsable de la aplicación, que ha recibido capacitación sobre procedimientos de seguridad y dispone de elementos de protección personal.

No reutilizar los envases para almacenar alimentos o bebidas.

ALMACENAMIENTO: No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**