

Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one- 1g/L
Aditivos csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**JIANGSU XINHE
AGROCHEMICAL CO., LTD.**
19, Xingang Road,
Economic Development Zone,
Xinyi City, Jiangsu Province
China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500 ml
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrele esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (<i>Capicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Nacchota (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Cereza (días)

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



1.2 cm

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Chlorothalonil	720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one	1 g/L
Aditivos	csp 1L

@INTEROC

Formulador:
INTEROC S.A.
Km. 16.5 vía Daule
Guayaquil - Ecuador
Telf.: (593 4) 288-1662

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrelle esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)
Para mayor información llame a: **INTESCC: 011-4001**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (franca)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	"Cercosporiosis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (<i>Capiscum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria altomata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha carmelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Carenza (días)
EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one- 1g/L
Aditivos csp 1L

PQA N° 581 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Formulador:
**JIANGSU UNITED
AGROCHEMICAL CO., LTD.**
11-Zitanyaju,
126 Mangdu Street,
Nanjing - China

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500 ml
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

18 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrela esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 9801-1-0200 (Línea gratuita)
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancho)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	"Cercosporiasis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Aroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha camelia"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Curación (días)

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)



Covert®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Chlorothalonil 720 g/L
1,2 - Benzisothiazolin-3-one- 1g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 581 - SENASA



Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 500 ml
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
NINGBO GENERIC
CHEMICAL Co., LTD.
Room 10 - 6, Shidai Square, No. 8
Lengjing Street, Ningbo 315010,
Zhejiang Province, China
Telf.: +86 574 87301088

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

18 cm

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrela esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o a ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita)

Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (L/ 200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	"Hielo (rancha)"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.4	7	0.2
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2 - 0.5	8	0.01
	"Roya del espárrago"	<i>Puccinia asparagi</i>	0.4 - 0.5		
	"Cercosporiosis" o "Mancha foliar"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.4 - 0.5		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	"Mancha del peral"	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.5 - 0.7	14	0.5
Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	2
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.4 - 0.5	21	0.01
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>)	"Mancha negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	0.5 - 0.6	1	0.01
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	"Mancha camelita"	<i>Bipolaris oryzae</i>	0.5 - 0.6	15	0.01

PC: Período de Curación (días)

EN CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, CONSIDERAR LAS EXIGENCIAS DEL PAÍS DESTINO

LMR: Límite Máximo de Residuos (PPM: Partes Por Millón)

