

Aplicar el producto al notar los primeros síntomas de la enfermedad, presentes en el cultivo, o cuando exista una alta presión de la enfermedad.

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin equipo de protección, hasta 12 horas después de la aplicación.

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de los plaguicidas. Evitar sustancias fuertemente alcalinas o ácidas. Se recomienda realizar preliminares para evaluar la compatibilidad física - química y biológica de los productos.

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

PESO MOLECULAR: 265.9

El aplicador debe usar todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

COVERT® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

PC = Período de Carencia **LMR =** Límite Máximo de Residuos



ENTER 1 ON CARD

En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar

“Realizar obligatoriamente el triple lavado”.

ALMACENAMIENTO: No almacenar en casas de habitación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas.

