

FORTALEZA®

20 SP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid..... 200 g/Kg
Aditivos c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 584 - SENASA

Titular del Registro, Importado y distribuido por:
INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.
Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A
Urb. Santa Patricia II Etapa
La Molina, Lima, Perú
Teléfono: 499-7831



Formulado por:
POINT AGRO-CHINA LTD
Rm 1206, Kaisa Plaza, 1091 East Renmin Road
Jiangyin, Jiangsu, China
Telf.: (86-510) 8061 8102

Contenido Neto: 1 Kg
Lote No.:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico y altamente peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión
- Altamente irritante al tracto y vías respiratorias.
- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- No reutilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- Almacenar el producto en ambiente fresco y ventilado, fuera de ambientes habitados por personas o animales.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de utilizado el producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar mascarilla de protección durante la mezcla y aplicación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
 - En caso de intoxicación oral o inhalatoria lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
 - En caso de ingestión accidental conviene vaciar el estómago induciendo al vómito, eliminar artificialmente la parte ingerida realizando el aspirado y lavado gástrico con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Teléfonos de Emergencia:**
CICOTOX: 328-7700 / ESSALUD: 411-8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico	g/cil	g/ha		
Algodón	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	200-250	400-500	14	0.5
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100-150	---	7	0.2

P.C.: Período de carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FORTALEZA 20 SP es un insecticida que presenta como ingrediente activo al acetamiprid que pertenece al grupo de los neonicotinoides. Presenta una acción sistémica, de contacto y translinar. Es absorbido rápidamente por el follaje y su penetración asegura una rápida residualidad.

FORTALEZA 20 SP afecta el sistema nervioso de los insectos causándoles la muerte; además tiene un efecto sobre huevos, ninfas y adultos de insectos.

Las aplicaciones de **FORTALEZA 20 SP** se realizan en campo abierto y en condiciones de invierno requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico, valor referencial es 400 L/ha).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **FORTALEZA 20SP** máximo 1 aplicación/campaña/año, dependiendo del grado de infestación de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO. - Se puede ingresar al campo sin equipo de protección 48 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD. - **FORTALEZA 20 SP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD. - **FORTALEZA 20 SP** no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

