

"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión. - Ligeramente irritante a los ojos y la piel. - Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora (traje impermeable, botas, protector facial, overol, guantes) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación. - No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas. - No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales. - Almacenar en un lugares frescos y ventilados. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleva al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si utiliza lentes de contacto, lavar los ojos por 5 minutos, retirar los lentes de contacto y continuar lavando con agua por 15 minutos más. - En caso de ingestión accidental del producto y solamente si el paciente está consciente, suministre abundante agua e induzca el vómito rápidamente.

- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811
ESSALUD: 411-8000 anexo 4.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente. - No posee antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. - Peligroso para organismos acuáticos. - Baja peligrosidad para aves. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

Proaxis® 60 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

Composición:

Gamma cyhalothrina60 g/L
Aditivosc.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 586-SENASA

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL
Av. República de Panamá 3531,
Int-1203, San Isidro - Lima, Perú

Formulado por:

Cheminova A/S
P.O. Box 9
DK 7620 Lemvig - Dinamarca



Importado y Distribuido por:

AGRO KLINGE S.A.
Calle René Descartes 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa,
Ate. Lima - Perú. Telf.: 612-6565
R.U.C No 20508704217



Contenido Neto: 1 L

No. Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROAXIS 60 CS es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. Pertenece al grupo 3 de IRAC. No es sistémico en la planta y tiene efecto adulticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de la polilla *Tuta absoluta* en el cultivo del tomate, de la mosquilla de los brotes *Prodioplosis longifolia* y gorgojo de los Andes *Premnotrypes suturalis* en el cultivo de papa y en gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregar la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

Equipo para la aplicación y su calibración - Preparación de la mezcla: Llene con agua el tanque de mezcla hasta ¾ o la ½ de su capacidad. Agregue la cantidad de Proaxis 60 CS que se vaya a utilizar, complete el volumen de agua y agite bien hasta que la mezcla sea homogénea. Mantenga la mezcla agitada, mezclando de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO				
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.6 - 0.8	-	1	0.1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodioplosis longifolia</i>	0.6	-	1	0.01
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotrypes suturalis</i>	-	0.2	1	0.01
Maiz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 - 0.25	-	1	0.05
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.6	0.2	5	0.01

*Gamma cihalothrina

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

ppm.: Partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el cultivo de maíz se recomienda una aplicación por campaña. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y solo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

PERÍODO DE REINGRESO: puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD: PROAXIS 60 CS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

P.E. - RT - Rev.06 - 21/08/20

	Producto: RT_Proaxis - 1 L - PE (AgroKlinge)	CORES:
	SKU label atual: n/a	PRETO
SKU label novo: n/a	Revisão Rev.06 - 21/08/20 Job.: 706/20	PANTONE 285 C
(11) 4321-3463	Formato: 270 x 130 mm	PANTONE 347 C
		PANTONE 199 C